

# トップガンL 250グラム (ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペント

適用雑草と使用方法

2008年7月23日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ クログワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ルビI2.5葉期 (但し、 移植後30日 まで)	砂壤土～ 埴土	250g/10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散 布又は無人 ヘリコプターに よる散布	全域（北 海道、東 北を除く ）の普通 期及び早 期栽培地 帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	水田一年生 雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類 による表層 はく離	稲1葉期～ノ ビI2.5葉期 (但し、収 穫90日前ま で)					全域（北 海道、東 北を除く ）				

# トップガンL 250グラム (ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペント

適用雑草と使用方法

2008年7月23日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>適用雑草名</small>	稲1葉期～12.5葉期 (但し、収穫90日前まで)	砂壤土～埴土	250g/10a	1回	灌水散布、灌水周縁散布又は無人ヘリコプターによる散布	全域 (北海道、東北を除く)	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内