ラオウ１キロ粒剤（ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル

適用雑草と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾀﾞｲﾑﾛﾝを含む農薬の総使用回数	ﾌｪﾉｷｻｽﾙﾎﾝを含む農薬の総使用回数	ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝを含む農薬の総使用回数	ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙを含む農薬の総使用回数
移植水稲	ｳﾘｶﾜ ｵﾓﾀﾞｶ ｸﾛｸﾞﾜｲ ｺｳｷﾔｶﾞﾗ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草 ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離	1kg/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	1回	湛水散布	3回以内（但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）	2回以内	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散布機で施用				
直播水稲	ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草		稲1葉期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期（但し、収穫90日前まで）		湛水散布	2回以内			

□ 新規登録月日：2021年12月22日