

ラオウジャンボ（ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒

適用雑草と使用方法

2021年12月22日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ダイムロンを含む農薬の総使用回数 | フェノキサスルホンを含む農薬の総使用回数 | フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数 | ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数 |
|------|--|-------------------------|----------------------------|---------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 移植水稻 | ウリカ オモダカ クログワイ コウキヤガラ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | 小包装（パック）10個（250g） / 10a | 移植直後～ノビエ2.5葉期（但し、移植後30日まで） | 1回 | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる | 3回以内（但し、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内） | 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |
| 直播水稻 | ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ ミスガヤツリ 一年生雑草 | | 稲1葉期～ノビエ2.5葉期（但し、収穫90日前まで） | | | 2回以内 | | | |

新規登録月日：2021年12月22日