

ラオウフロアブル（ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル

適用雑草と使用方法

2021年12月22日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイムロンを含む農薬の総使用回数	フェノキサスルホンを含む農薬の総使用回数	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウリカ オモダカ クダマ コウキガウ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草	500ml/10a	移植直後～ノ ビエ2.5葉期 (但し、移 植後30日ま で)	1回	原液湛水散 布又は水口 施用	3回以内（ 但し、育 苗箱散布 は1回以内 、本田で は2回以内 ）	2回以内	2回以内	2回以内
			移植時		田植同時散 布機で施用				
直播水稻	ウリカ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ 一年生雑草		稲1葉期～ノ ビエ2.5葉期（ 但し、収穫9 0日前まで）		原液湛水散 布	2回以内			

新規登録月日：2021年12月22日