

トップガンLフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(北陸を除く) クログワイ セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ル ¹ I3葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土	500ml/10 a	1回	原液湛水散布	全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植時				田植同時散布機で施用					
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類 による表層はく離	稲1.5葉期～ ル ¹ I3葉期 (但し、収穫90日前まで)	砂壤土			原液湛水散布	全域（北海道、東北を除く）				
		稲1葉期～ ル ¹ I3葉期 (但し、収穫90日前まで)	壤土～ 埴土								

トップガンLフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	水田一年生雑草 ウリカ セリ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離	稲1葉期～ノビI3葉期（但し、収穫90日前まで）	壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布	全域（北海道、東北を除く）	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内