デュアルサイド水和剤（プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン水和剤）

適用病害虫と使用方法　　2018年2月14日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ脂肪酸ｴｽﾃﾙを含む農薬の総使用回数	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ複合体を含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾀﾞﾆ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	-	2回以内
すいか				収穫3日前まで	5回以内			5回以内
ﾒﾛﾝ	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾀﾞﾆ類			収穫前日まで				5回以内（但し、塗布は1回以内）
ﾄﾏﾄ	葉かび病 ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ ｱｻﾞﾐｳﾏ類				3回以内			3回以内
なす	うどんこ病 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾀﾞﾆ類							
いちご	ﾊﾀﾞﾆ類			収穫開始14日前まで				
なし	うどんこ病 ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ ﾊﾀﾞﾆ類		200～700L/10a	収穫7日前まで	5回以内			5回以内（但し、ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩・ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ水和剤は3回以内）
りんご	褐斑病 斑点落葉病 ﾊﾀﾞﾆ類			収穫3日前まで	3回以内			5回以内（但し、散布は3回以内）

デュアルサイド水和剤（プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン水和剤）

適用病害虫と使用方法　　2018年2月14日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙﾓﾉ脂肪酸ｴｽﾃﾙを含む農薬の総使用回数	ﾎﾟﾘｵｷｼﾝ複合体を含む農薬の総使用回数
ぶどう	灰色かび病 ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ ﾊﾀﾞﾆ類	2000倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	5回以内	散布	-	5回以内
かき	灰色かび病 ｱｻﾞﾐｳﾏ類			収穫30日前まで	3回以内			3回以内