

デュアルサイド水和剤（プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン水和剤）

適用病害虫と使用方法

2018年2月14日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数	ポリオキシン複合体を含む農薬の総使用回数	
きゅうり	うどんこ病 アザミウマ類 ハダニ類	2000倍	100～300L/ 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	-	2回以内	
すいか				収穫3日前まで					5回以内
メロン	アザミウマ類 ハダニ類			収穫前日まで					
トマト	葉かび病 トマトザビダニ アザミウマ類			3回以内					
なす	うどんこ病 アザミウマ類 ハダニ類								
いちご	ハダニ類			収穫開始14日 前まで					
なし	うどんこ病 チャノキアザミウマ ハダニ類			200～700L/ 10a	収穫7日前まで				5回以内
りんご	褐斑病 斑点落葉病 ハダニ類		収穫3日前まで	3回以内		5回以内（但し、散布は3回以内）			

デュアルサイド水和剤（プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル・ポリオキシン水和剤）

適用病害虫と使用方法

2018年2月14日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピレングリコールモノ脂肪酸エステルを含む農薬の総使用回数	ポリオキシン複合体を含む農薬の総使用回数
ぶどう	灰色かび病 チャノキアザミウマ ハダニ類	2000倍	200～700L/ 10a	収穫60日前まで	5回以内	散布	-	5回以内
かき	灰色かび病 アザミウマ類			収穫30日前まで	3回以内			3回以内