

ブーンハーデス箱粒剤（スピネトラム・トリフルメゾピリム・ジクロベンチアゾクス・ペンフルフェ

2024年1月31日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピネトラムを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数	ジクロベンチアゾクスを含む農薬の総使用回数	ペンフルフェンを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 紋枯病 ウカ類 イネドモイムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)	1回
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り							
	イネミスジウシ幼虫	50～100g)	移植3日前～移植当日						
		育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g							

適用拡大登録月日：2024年01月31日