

# ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年8月23日現在

| 作物名       | 適用病害虫                               | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期     | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 70メキを含む農薬の総使用回数 |      |      |      |      |
|-----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------|---------|------|-----------------|------|------|------|------|
| だいこん      | コガ                                  | 1000～2000倍 | 100～300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内    | 散布   | 2回以内            |      |      |      |      |
| たまねぎ      | アザミウマ類                              | 2000倍      |              | 収穫3日前まで  | 3回以内    |      | 3回以内            |      |      |      |      |
| にんにく      |                                     |            |              | 収穫前日まで   | 2回以内    |      | 2回以内            |      |      |      |      |
| あさつき      | アザミウマ類<br>ネギハモグリバエ                  | 1000～2000倍 |              | 収穫3日前まで  | 3回以内    |      | 2回以内            | 2回以内 |      |      |      |
| にら        | アザミウマ類                              |            |              |          |         |      |                 |      |      |      |      |
| ねぎ        | ネギハモグリバエ                            |            |              |          |         |      |                 |      |      |      |      |
| わけぎ       | アザミウマ類<br>ネギハモグリバエ                  |            |              |          |         |      |                 |      |      |      |      |
| すいか       | アザミウマ類                              | 1000～2000倍 |              | 収穫前日まで   | 3回以内    |      | 3回以内            | 3回以内 |      |      |      |
| しょくようほおずき |                                     | 2000倍      |              |          |         |      |                 |      | 2回以内 | 2回以内 |      |
| トマト       | タバコナジラミ類(シルバー-リーフナジラミを含む)<br>アザミウマ類 | 1000～2000倍 |              |          |         |      |                 |      | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
|           | トマトサビダニ                             | 1000～4000倍 |              |          |         |      |                 |      |      |      |      |
| ミニトマト     | タバコナジラミ類(シルバー-リーフナジラミを含む)<br>アザミウマ類 | 1000～2000倍 |              |          |         |      |                 |      | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
|           | トマトサビダニ                             | 1000～4000倍 |              |          |         |      |                 |      |      |      |      |
| なす        | タバコナジラミ類(シルバー-リーフナジラミを含む)           | 1000倍      | 3回以内         |          |         | 3回以内 |                 |      | 3回以内 |      |      |
|           | アザミウマ類                              | 1000～2000倍 |              |          |         |      |                 |      |      |      |      |

適用拡大登録月日：2023年08月23日

# ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年8月23日現在

| 作物名    | 適用病害虫                               | 希釈倍数       | 使用液量         | 使用時期    | 本剤の使用回数 | 使用方法 | 70メキンを含む農薬の総使用回数 |              |         |        |      |         |      |
|--------|-------------------------------------|------------|--------------|---------|---------|------|------------------|--------------|---------|--------|------|---------|------|
| ピーマン   | タバコナジラミ類(シルバー-リーフナジラミを含む)           | 1000倍      | 100～300L/10a | 収穫前日まで  | 3回以内    | 散布   | 3回以内             |              |         |        |      |         |      |
|        | アザミウマ類                              | 1000～2000倍 |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| ししとう   | タバコナジラミ類(シルバー-リーフナジラミを含む)           | 1000倍      |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
|        | アザミウマ類                              | 1000～2000倍 |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| カリフラワー | コナガ                                 | 倍          |              |         |         |      |                  | 2回以内         | 収穫3日前まで | 2回以内   | 2回以内 |         |      |
|        | アザミウマ類<br>アオムシ                      | 1000倍      |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| ブロッコリー | コナガ                                 | 1000～2000倍 |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
|        | アザミウマ類<br>アオムシ                      | 1000倍      |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| キャベツ   | コナガ<br>アザミウマ類                       | 1000～2000倍 |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
|        | アオムシ                                | 1000倍      |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| はくさい   | コナガ                                 | 1000～2000倍 | 2回以内         | 収穫7日前まで | 3回以内    | 3回以内 |                  |              |         |        |      |         |      |
|        | アオムシ                                | 1000倍      |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| きく(葉)  | アザミウマ類                              | 2000倍      |              |         |         |      | 2回以内             |              |         |        |      | 収穫3日前まで | 2回以内 |
| しそ     |                                     |            |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| バジル    |                                     |            |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| ほうれんそう |                                     |            |              |         |         |      |                  |              |         |        |      |         |      |
| アスパラガス | タバコナジラミ類(シルバー-リーフナジラミを含む)<br>アザミウマ類 |            |              |         |         |      |                  | 100～800L/10a | 2回以内    | 収穫前日まで | 2回以内 |         |      |
| 食用ぎく   | アザミウマ類                              |            |              |         |         |      |                  | 100～300L/10a |         |        |      |         |      |
| いちご    |                                     |            |              |         |         |      |                  | 1000～2000倍   |         |        |      |         |      |
| しそ(花穂) |                                     |            |              |         |         |      |                  | 2000倍        |         |        |      |         |      |


適用拡大登録月日：2023年08月23日

# ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年8月23日現在

| 作物名      | 適用病害虫                        | 希釈倍数         | 使用液量         | 使用時期                                     | 本剤の使用回数 | 使用方法   | 70メキを含む農薬の総使用回数 |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|--|---------|--|-----------------|
| みょうが(花穂) | アザミウマ類                       | 1000倍        | 100～300L/10a | 収穫前日まで                                   | 3回以内    | 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する | 3回以内            |
| みょうが(茎葉) |                              |              |              | みょうが(花穂)の収穫前日まで但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで |         | 散布   |                 |
| かんきつ     | ミカンサビダニ<br>アザミウマ類<br>チャノホリダニ | 2000～4000倍   | 200～700L/10a | 収穫7日前まで                                  | 2回以内    |  | 2回以内            |
| マンゴー     | アザミウマ類                       | 2000倍        |              | 収穫前日まで                                   |         |  |                 |
| きく       |                              | 100～300L/10a | 発生初期         |  |         |  |                 |
| グロリア     |                              |              | 1000倍        |  |         |  |                 |
| ほおずき     |                              |              | 2000倍        |  |         |  |                 |
| 茶        | チャノキイロアザミウマ                  | 1000～4000倍   | 200～400L/10a | 摘採14日前まで                                 |         |  |                 |
|          | チャノホリガ                       | 2000～4000倍   |              |  |         |  |                 |

 適用拡大登録月日：2023年08月23日