

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2025年1月29日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70メキヤを含む農薬の総使用回数
だいこん	-	コナガ	1000～2000倍	100～300L/ 10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
たまねぎ		アザミウマ類			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
にんにく		アザミウマ類 ネギハモグリバエ	2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
あさつき					アザミウマ類	収穫3日前まで		
にら		アザミウマ類	1000～2000倍					
ねぎ		ネギハモグリバエ	2000倍					
わけぎ		アザミウマ類 ネギハモグリバエ	1000～2000倍		収穫前日まで			
すいか		アザミウマ類			3回以内			
しょくようほおずき		アザミウマ類	2000倍			2回以内		2回以内
トマト		タバココナジラミ類(シルバ-リ-コナジラミを含む) アザミウマ類	1000～2000倍			3回以内		3回以内
		トマトサビダニ	1000～4000倍					
ミニトマト		タバココナジラミ類(シルバ-リ-コナジラミを含む) アザミウマ類	1000～2000倍					
		トマトサビダニ	1000～4000倍					
なす		タバココナジラミ類(シルバ-リ-コナジラミを含む)	1000倍					
	アザミウマ類	1000～2000倍						

適用拡大登録月日：2025年01月29日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2025年1月29日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70メキンを含む農薬の総使用回数
なす	温室、ガラス室、ビニルハウス等の密閉できる場所	アザミウマ類	67倍	10L/10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧	3回以内
ピーマン	-	タバコナジラミ類(シルバー-リーフコナジラミを含む)	1000倍	100～300L/ 10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
		アザミウマ類	1000～2000倍					
ししとう		タバコナジラミ類(シルバー-リーフコナジラミを含む)	1000倍					
		アザミウマ類	1000～2000倍					
カリフラワー		コナガ	倍					
		アザミウマ類 アオムシ	1000倍					
ブロッコリー		コナガ	1000～2000倍					
		アザミウマ類 アオムシ	1000倍					
キャベツ		コナガ	1000～2000倍					
		アザミウマ類 アオムシ	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年01月29日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2025年1月29日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70メキンを含む農薬の総使用回数	
はくさい	-	コナガ	1000～2000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
		アオムシ	1000倍						
きく(葉)		アザミウマ類	2000倍						収穫3日前まで
しそ				収穫前日まで	3回以内				
バジル					2回以内				
ほうれんそう				収穫14日前まで					
アスパラガス		タバコナジラミ類(シルバー-リーフコナジラミを含む) アザミウマ類		100～800L/ 10a	収穫前日まで				
食用ぎく		アザミウマ類		100～300L/ 10a	収穫3日前まで	3回以内			
しそ(花穂)					収穫前日まで				
いちご				1000～2000倍					3回以内
みょうが(花穂)				1000倍					散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する
		温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所		33倍	10L/10a				常温煙霧、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。

適用拡大登録月日：2025年01月29日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2025年1月29日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70センチを含む農薬の総使用回数
みょうが(花穂)	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所	アザミウマ類	33倍	10L/10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	3回以内
みょうが(茎葉)	-	アザミウマ類	1000倍	100～300L/10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあつては開花期終了まで	3回以内	散布	3回以内
	温室、ガラス室、ビニールハウス等の密閉できる場所		33倍	10L/10a			常温煙霧	
かんきつ	-	ミカンザビダニ アザミウマ類 チャノホコリダニ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
マンゴ-		アザミウマ類	2000倍		収穫前日まで			

適用拡大登録月日：2025年01月29日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法

2025年1月29日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	70メキンを含む農薬の総使用回数
きく	-	アザミウマ類	2000倍	100～300L/ 10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
<small>ゲリガ ダリア</small>			1000倍					
ほおずき			2000倍					
ランキュラス			1000倍					
茶		チャノキイロアザミウマ	1000～4000倍	200～400L/ 10a	摘採14日前まで			
	チャノホリガ	2000～4000倍						

 適用拡大登録月日：2025年01月29日