ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年2月10日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾛﾒﾄｷﾝを含む農薬の総使用回数
だいこん	-	ｺﾅｶﾞ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
たまねぎ		ｱｻﾞﾐｳﾏ類			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
にんにく			2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
あさつき		ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ						
にら		ｱｻﾞﾐｳﾏ類			収穫3日前まで			
ねぎ			1000～2000倍					
		ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ	2000倍					
わけぎ		ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ			収穫前日まで			
さやいんげん 未成熟そらまめ		ｱｻﾞﾐｳﾏ類						
すいか			1000～2000倍			3回以内		3回以内
しょくようほおずき			2000倍			2回以内		2回以内
ﾄﾏﾄ		ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む) ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍			3回以内		3回以内
		ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ	1000～4000倍					
ﾐﾆﾄﾏﾄ		ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む) ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍					
		ﾄﾏﾄｻﾋﾞﾀﾞﾆ	1000～4000倍					
なす		ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む)	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年2月10日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾛﾒﾄｷﾝを含む農薬の総使用回数
なす	－	ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む)	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
		ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍					
	温室､ｶﾞﾗｽ室､ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等の密閉できる場所		67倍	10L/10a			常温煙霧	
ﾋﾟｰﾏﾝ	－	ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む)	1000倍	100～300L/10a			散布	
		ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍					
ししとう		ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む)	1000倍					
		ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍					
ｶﾘﾌﾗﾜｰ		ｺﾅｶﾞ			収穫3日前まで	2回以内		2回以内
		ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱｵﾑｼ	1000倍					
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ		ｺﾅｶﾞ	1000～2000倍					
		ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｱｵﾑｼ	1000倍					
非結球あぶらな科葉菜類		ｺﾅｶﾞ	2000倍		収穫7日前まで			
ｷｬﾍﾞﾂ		ｺﾅｶﾞ ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍		収穫3日前まで			

適用拡大登録月日：2025年02月10日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年2月10日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾛﾒﾄｷﾝを含む農薬の総使用回数
ｷｬﾍﾞﾂ	-	ｺﾅｶﾞ ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
		ｱｵﾑｼ	1000倍					
はくさい		ｺﾅｶﾞ	1000～2000倍		収穫7日前まで			
		ｱｵﾑｼ	1000倍					
ﾚﾀｽ		ｱｻﾞﾐｳﾏ類			収穫3日前まで			
きく(葉)			2000倍					
しそ					収穫前日まで	3回以内		3回以内
ﾊﾞｼﾞﾙ						2回以内		2回以内
ほうれんそう					収穫14日前まで			
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ		ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ類(ｼﾙﾊﾞｰﾘｰﾌｺﾅｼﾞﾗﾐを含む) ｱｻﾞﾐｳﾏ類		100～800L/10a	収穫前日まで			
食用ぎく		ｱｻﾞﾐｳﾏ類		100～300L/10a	収穫3日前まで			
しそ(花穂)					収穫前日まで			
いちご			1000～2000倍			3回以内		3回以内
みょうが(花穂)			1000倍				散布、但し花穂の発生期にはﾏﾙﾁﾌｨﾙﾑ被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	

適用拡大登録月日：2025年02月10日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年2月10日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾛﾒﾄｷﾝを含む農薬の総使用回数
みょうが(花穂)	温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等の密閉できる場所	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	33倍	10L/10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧、但し花穂の発生期にはﾏﾙﾁﾌｨﾙﾑ被覆により煙霧が直接花穂に飛散しない状態で使用する。	3回以内
みょうが(茎葉)	-		1000倍	100～300L/10a	みょうが(花穂)の収穫前日まで　但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで		散布	
	温室、ｶﾞﾗｽ室、ﾋﾞﾆｰﾙﾊｳｽ等の密閉できる場所		33倍	10L/10a			常温煙霧	
かんきつ	-	ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内

適用拡大登録月日：2025年02月10日

ファインセーブフロアブル（フロメトキン水和剤）

適用害虫と使用方法　　2025年2月10日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾌﾛﾒﾄｷﾝを含む農薬の総使用回数
かんきつ	-	ﾐｶﾝｻﾋﾞﾀﾞﾆ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾁｬﾉﾎｺﾘﾀﾞﾆ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
もも		ｱｻﾞﾐｳﾏ類	2000倍		収穫前日まで			
ぶどう		ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾌﾞﾄﾞｳｻﾋﾞﾀﾞﾆ						
ﾏﾝｺﾞｰ		ｱｻﾞﾐｳﾏ類						
きく				100～300L/10a	発生初期			
ｸﾞﾛﾘｵｻﾀﾞﾘｱ			1000倍					
ほおずき			2000倍					
ﾗﾅﾝｷｭﾗｽ			1000倍					
茶		ﾁｬﾉｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ	1000～4000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで			
		ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ	2000～4000倍					

適用拡大登録月日：2025年02月10日