テッシン豆つぶ２５０（ピラクロニル・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル剤）

適用雑草と使用方法

2024年8月7日現在

作物名	適用雑草名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙを含む農薬の総使用回数	ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝを含む農薬の総使用回数	ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙを含む農薬の総使用回数
移植水稲	ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ ﾅｶﾞｴﾂﾙﾉｹﾞｲﾄｳ 一年生雑草 多年生広葉雑草 ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離	250g/10a	移植直後～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期(但し、移植後30日まで)	1回	湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稲	ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草 ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離		稲出芽揃期～ﾉﾋﾞｴ2.5葉期(但し、収穫90日前まで)		湛水散布、湛水周縁散布又は無人航空機による散布			

適用拡大登録月日：2024年08月07日