

トップガンフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(東北) クダマ(東北) シズイ(東北) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(東北) アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植直後～ ル ¹ I3葉期 (但し、移植後30日まで)	砂壤土～ 埴土	500ml/10 a	1回	原液湛水散布	東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
	水田一年生雑草 ウリカ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ アオミドロ・藻類 による表層はく離	移植後5日～ ル ¹ I3葉期 (但し、移植後30日まで)					北海道				

トップガンフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカワ セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後5日～ ビエ3葉期（但し、移植後30日まで）	砂壤土～ 埴土	500ml/10 a	1回	原液湛水散布	北海道	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
	水田一年生雑草 ウリカワ オモダカ(東北) クログワイ(東北) シズイ(東北) セリ ヒルムシロ ハラオモダカ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ(東北) アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時				田植同時散布機で施用	東北				
直播水稻	水田一年生雑草 ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ	稲1.5葉期～ ビエ3葉期（但し、収穫90日前まで）	壤土～埴土			原液湛水散布	北海道、東北				

トップガンフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法

2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
直播水稻	<small>水田一年生雑草 8984 7954 22*8 199</small>	稲1.5葉期～13葉期（ 但し、収穫90日前まで）	壤土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布	北海道、東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内