トップガンフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法　　2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 ｳﾘｶﾜ ｵﾓﾀﾞｶ(東北) ｸﾛｸﾞﾜｲ(東北) ｼｽﾞｲ(東北) ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ(東北) ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離	移植直後～ﾉﾋﾞｴ3葉期（但し、移植後30日まで）	砂壌土～埴土	500ml/10a	1回	原液湛水散布	東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
	水田一年生雑草 ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離	移植後5日～ﾉﾋﾞｴ3葉期（但し、移植後30日まで）					北海道				

トップガンフロアブル（ピリミノバックメチル・ブロモブチド・ベンスルフロンメチル・ペントキサ

適用雑草と使用方法　　2009年9月15日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ブロモブチドを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数	ペントキサゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稲	水田一年生雑草 ｳﾘｶﾜ ｵﾓﾀﾞｶ(東北) ｸﾛｸﾞﾜｲ(東北) ｼｽﾞｲ(東北) ｾﾘ ﾋﾙﾑｼﾛ ﾍﾗｵﾓﾀﾞｶ ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ(東北) ｱｵﾐﾄﾞﾛ･藻類による表層はく離	移植時	砂壌土～埴土	500ml/10a	1回	田植同時散布機で施用	東北	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稲	水田一年生雑草 ﾎﾀﾙｲ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ	稲1.5葉期～ﾉﾋﾞｴ3葉期（但し、収穫90日前まで）	壌土～埴土			原液湛水散布	北海道、東北				