

ブーンアレスモンガレス箱粒剤（オキサゾスルフィル・インピルフルキサム・ジクロベンチアゾクス

2025年1月15日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサゾスルフィルを含む農薬の総使用回数	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数	ジクロベンチアゾクスを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病 紋枯病 いこ類 うか類 イネスゾウムシ イネトコイムシ コブノメイガ ニカメイユウ フタホコヤガ ツマゲロコバエ イネツトムシ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)						
	白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病		移植当日					
		育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g						

適用拡大登録月日：2025年01月15日

ブーンアレスモンガレス箱粒剤（オキサゾスルフィル・インピルフルキサム・ジクロベンチアゾクス

2025年1月15日現在

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサゾスルフィルを含む農薬の総使用回数	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数	ジクロベンチアゾクスを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	白葉枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回	1回	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)

 適用拡大登録月日：2025年01月15日