

フェニックスマストフロアブル（ジクロロメゾチアズ・フルベンジアミド水和剤）

2025年3月26日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメゾチアズを含む農薬の総使用回数	フルベンジアミドを含む農薬の総使用回数
だいこん	コナガ キスジノミハムシ ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内
ブロッコリー	コナガ ハスモンヨトウ アオムシ			収穫3日前まで				3回以内(但し、 灌注は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)
キャベツ	ウワバ類 コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイモジヨトウ アオムシ			収穫前日まで				4回以内(但し、 灌注は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計3回以内)
はくさい	コナガ ハイマダラノメイガ アオムシ							
レタス	ナメグ リバエ オオタバコガ ヨトウムシ						3回以内(但し、 灌注は1回以内、 散布及び無人航空機 散布は合計2回以内)	
非結球レタス							2回以内	

適用拡大登録月日：2025年03月26日