

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

2025年10月29日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	休草	生育期(但し、収穫前日まで)	300~500mL/10a	50~100L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
林木	林地	草	生育初期(5月~6月)	つる径:使用量(mL/株) 2.0cm以下:0.5、2.1~3.0cm:1.0、3.1~4.0cm:1.5、4.1~5.0cm:2.0、5.1cm以上:適宜増量	原液		つる注入処理	
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、運動場、宅地等						生育期	

 適用拡大登録月日：2025年10月29日

グラスショット液剤（ビスピリバックナトリウム塩液剤）

2025年10月29日現在

作物名	適用場所	適用雑草名	使用目的	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ビスピリバックナトリウム塩を含む農薬の総使用回数
水田作物(水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	草丈抑制による刈り取り軽減	雑草生育初期 又は草刈り後 10~20日の雑草再生期(但し、収穫前日まで)	300~500mL/10a	通常散布50~100L/10a、 少量散布25L/10a	3回以内	雑草茎葉散布	3回以内
樹木等	公園、庭園、 堤とう、 駐車場、運動場、 宅地等			雑草生育期 又は刈取後	500~1000mL/10a	通常散布100~200L/10a、 少量散布25~50L/10a		植栽地を除く樹木等の 周辺地に雑草茎葉散布	

 適用拡大登録月日：2025年10月29日