

# パットフルLジャンボ（オキサジクロメホン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤）

適用雑草と使用方法

2007年12月12日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オトコガ（北陸を除く） クダマ（北陸を除く） セリ ヒルムシロ（北陸を除く） ホタルイ マツバ ミスガヤツリ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植後1日～ルビ2.5葉期（但し、移植後30日まで）	砂壤土～埴土	小包装（パック）10個（250g） / 10a	1回	水田に小包装（パック）のまま投げ入れる	全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内

# パットフルLジャンボ（オキサジクロメホン・ピリミノバックメチル・ベンスルフロンメチル剤）

適用雑草と使用方法

2007年12月12日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	<small>オキザリス・ジコクメロン・オキザリス・ジコクメロン・オキザリス・ジコクメロン</small>	移植後1日～12.5葉期（但し、移植後30日まで）	砂壤土～埴土	小包装（パッ）10個（250g）/10a	1回	水田に小包装（パッ）のまま投げ入れる	全域（北海道、東北を除く）の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内