

パットフルエースLジャンボ（オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベン

適用雑草と使用方法

2007年8月1日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを含む農薬の総使用回数	クロメプロップを含む農薬の総使用回数	ピリミノバックメチルを含む農薬の総使用回数	ベンスルフロンメチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草 ウリカ オモダカ(北陸を除く) クグワ(北陸を除く) セリ ヒルムシロ ホタルイ マツバイ ミスガヤツリ アオシロ・藻類による表層はく離(関東・東山・東海を除く)	移植後3日～ル ² 2.5葉期(但し、移植後30日まで)	砂壤土～埴土	小包装(パック)10個(250g)/10a	1回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる	関東・東山・東海、九州の普通期及び早期栽培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
		移植後1日～ル ² 2.5葉期(但し、移植後30日まで)									

パットフルエースLジャンボ（オキサジクロメホン・クロメプロップ・ピリミノバックメチル・ベン

適用雑草と使用方法

2007年8月1日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	オキサジクロメホンを 含む農薬の 総使用回数	クロメプロ ップを含む 農薬の総使 用回数	ピリミノバ ックメチルを 含む農薬の 総使用回数	ベンスルフ ロメチルを 含む農薬の 総使用回数
移植水稻		移植後1日～ヒレ2.5葉期（ 但し、移植後30日まで）	砂壤土～埴土	小包装（ハック）1 0個（250g）/10a	1回	水田に小包装（ハック） のまま投げ入れる	北陸、近畿・中国・四 国の普通期及び早期栽 培地帯	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内