

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	ハダニ類 材タバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
かんしょ	ハダニ類 ハスモンヨトウ ヨツモンカメノコハムシ	2000～4000倍					
さといも	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000倍		収穫7日前まで			
やまのいも	カンザワハダニ ナガイモコガ			収穫前日まで			
かぶ	コナガ ナメケリハエ ヨトウムシ						
しょうが	ハスモンヨトウ						
だいこん	コナガ ダクイコンサルハムシ アオムシ			収穫14日前まで			
てんさい	ハダニ類 カメノコハムシ ヨトウムシ			収穫7日前まで			
にんじん	キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類 ヨトウムシ			収穫前日まで			
葉にんにく	ハダニ類			収穫14日前まで			
ねぎ	ヒョウタンゾウムシ類 ネギハメケリハエ ネギコガ シロイチモジヨトウ			収穫7日前まで	2回以内		2回以内
あずき	ハダニ類 ノメイガ類			収穫3日前まで			

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	
豆類(未成熟、ただし、さやいんげん、さやえんどう、実えんどうを除く)	ハダニ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ							
さやえんどう 実えんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ							
うり類(漬物用)	ミナキイロアザミウマ ハダニ類							
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 ウリハムシ ウリノメイガ				3回以内			3回以内
にがうり かぼちゃ(日本かぼちゃ)	ミナキイロアザミウマ				2回以内			2回以内
すいか					4000倍			
	ハダニ類 ウリノメイガ オオタバコガ	2000倍						
トマト ミニトマト	トマトサビダニ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ オオタバコガ			3回以内	3回以内			

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数	
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ テントウムシダマシ類 ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ チャノホコリダニ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内	
ピーマン とうがらし類(ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ				2回以内		2回以内	
ししとう	ヒラスハナアザミウマ	4000倍						
	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ	2000倍						
カリフラワー	コナガ				収穫3日前まで			
茎ブロッコリー	アオムシ				収穫前日まで			
ブロッコリー	コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ				収穫3日前まで			
インサイ	ハスモンヨトウ							
つるむらさき					収穫7日前まで		1回	1回
モロヘイヤ	アザミウマ類							
やなぎたで	ハスモンヨトウ				2回以内	2回以内		

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数		
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、ひろしまな、チゲンサイ、さんとうさいを除く)	コナガ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回		
こまつな	コナガ ハクサイダニ アオムシ			収穫3日前まで					
チゲンサイ	コナガ			収穫7日前まで					
非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ						2回以内		2回以内
なばな					収穫3日前まで				
さんとうさい	コナガ						1回		1回
ひろしまな	コナガ アオムシ							2回以内	2回以内
キャベツ	タマキノウワバ コナガ ハイマダノメイガ オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ				収穫前日まで				
はくさい	コナガ カブラハバチ ヨトウムシ アオムシ								
メキャベツ	ハスモンヨトウ				収穫7日前まで				
あしたば	ウトノメイガ								
コリアンダー(葉)	ハスモンヨトウ								
セルリー	ヨトウムシ		収穫14日前まで						

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
はまぼうふう(葉)	ハダニ類	2000倍	100～300L/10a	親株養成期（但し、収穫90日前まで）	3回以内	散布	3回以内
みつば	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで（但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで）	1回		1回
レタス	ナメクリハエ オタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ			収穫前日まで	2回以内		2回以内
きく(葉)	アワダチソウゲンバイ ミカンキロアザミウマ ミナミキロアザミウマ ハダニ類 オタバコガ ヨトウムシ類			収穫7日前まで			
しゅんぎく	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで			
すいぜんじな	ハダニ類 ヨトウムシ			収穫前日まで	3回以内		3回以内
葉ごぼう	ハスモンヨトウ			収穫7日前まで			
よもぎ	ミナミキロアザミウマ			収穫3日前まで			
ほうれんそう	ホウレンソウウケガコダニ	4000～6000倍	2葉期まで（但し、収穫14日前まで）				

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
アスパラガス	ハダニ類 ジユウホシクビナガハムシ オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000倍	100～500L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
うど	シクラメンホコリダニ			根株養成期（但し、収穫75日前まで）			
さといも（葉柄）	カンザワハダニ		収穫3日前まで				
はすいも（葉柄）	ハスモンヨトウ		収穫前日まで				
つわぶき	ハダニ類		収穫14日前まで				
ふき	ハダニ類 ハスモンヨトウ		収穫7日前まで				
食用エキザカム	ミカンキロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類		収穫14日前まで				
食用ぎく	アワダチソウゲンバエ ミカンキロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ類		収穫3日前まで				
食用金魚草 食用せんにちこう 食用トニア 食用なでしこ 食用パンジー	ミカンキロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類		収穫14日前まで				

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
食用ﾌﾟﾘﾓﾗ	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類 ハスモンヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類			収穫3日前まで			
いちご	ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ			収穫前日まで			
okra	オオタバコガ ハスモンヨトウ						
たらのぎ	ハダニ類			収穫90日前まで			
なんてん(葉)	アザミウマ類			収穫14日前まで			
ふき(ふきのとう)	ハダニ類 ハスモンヨトウ			収穫90日前まで			
やまのいも(むかご)	カンザワハダニ ナガイモコガ			収穫3日前まで			
ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ			収穫前日まで			
みょうが(花穂)	ハダニ類						

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みょうが(茎葉)	ハダニ類	2000倍	100～300L/10a	みょうが（花穂）の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで	2回以内	散布	2回以内
せんきゅう				収穫前日まで			
とうき				収穫14日前まで			
みしまさいこ				収穫21日前まで			
かんぎつ	カネタキ リュウキュウミカンサビダニ ヨモギエダシヤク スグトリウムシ ハスモンヨトウ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫前日まで			
	ミカンサビダニ アザミウマ類(ネアザミウマを除く) チャノホコリダニ	2000～6000倍					
なし	ニセサビダニ カンザワハダニ ナミハダニ	2000～3000倍			3回以内		3回以内
	ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ	2000倍					
りんご	リンゴサビダニ ヨモギエダシヤク	2000～4000倍			2回以内		2回以内
	ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類 キンモンホリガ	2000倍					

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
おうとう	ウメシロカイガラムシ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ ナミハダニ オウトウショウジヨウハエ	2000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
もも	ウメシロカイガラムシ モモサビダニ カンザワハダニ ナミハダニ モモハモグリガ			収穫前日まで			
	ミカンキイロアザミウマ	2000～4000倍					
ネクタリン	ウメシロカイガラムシ モモサビダニ カンザワハダニ ナミハダニ モモハモグリガ	2000倍		収穫7日前まで			
	ミカンキイロアザミウマ	2000～4000倍					
小粒核果類(すももを除く)	ウメシロカイガラムシ オウトウハダニ	2000倍		収穫前日まで			
すもも	イラガ類 ウメシロカイガラムシ オウトウハダニ						
ぶどう	コガネムシ類 カンザワハダニ ナミハダニ ミノガ類 モンキクロノメイガ ハスモンヨトウ トビイロトラガ ブトウハモグリガ			収穫60日前まで			

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ぶどう	チャノキアザミウマ ミカンキアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ブドウサビダニ	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	2回以内	散布	2回以内
ブルーベリー	イラガ類 オウトウショウジ ヨウバエ	2000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
マンゴー	チャノキアザミウマ	4000倍	2000倍	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
さんしょう(果実)				収穫7日前まで			
ゴレンシ	カンザワハダニ			収穫14日前まで			
いちじく	ヒラス ハナアザミウマ カンザワハダニ	2000～4000倍	2000倍	収穫前日まで			
かき	イラガ類 カキサビダニ アザミウマ類 カキノハタムシガ カンザワハダニ ナミハダニ			収穫14日前まで			
キウイフルーツ	コガネムシ類 キウイヒメヨコバイ	2000倍	2000倍	収穫前日まで			
花き類・観葉植物(きく、ストックを除く)	ミカンキアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類			150～300L/10a			

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年8月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
きく	アワダチソウゲンハイ ミカンキイロアザミウマ ミナキイロアザミウマ ハダニ類 オオタバコガ ヨトウムシ類	2000倍	150～300L/10a	発生初期	2回以内	散布	2回以内
ストック	コナガ ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 ヨトウムシ類 アオムシ						
しきみ	クスアナアキゾウムシ		200～700L/10a				
アザレア	チャノホコリダニ		100～300L/10a				
茶	チャトゲコナジラミ チャノナガサビダニ シャクトリムシ類 チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャノミドリヒメヨコバイ チャノホコリダニ		200～400L/10a	摘採7日前まで			

コテツフロアブル（クロルフェナピル水和剤）

2020年8月26日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラス室等密閉できる場所	ミカキイロアザミウマ	300ml/10a	10L/10a	収穫前日まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
ぶどう		チャノキイロアザミウマ	150ml/10a	6L/10a	収穫14日前まで			