

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年9月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数			
かぶ	ハモグリバエ類	5000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
だいこん	コナガキスジノミハムシ アオムシ	2500～5000倍		収穫7日前まで						
にんじん	ハモグリバエ類	5000倍		収穫3日前まで						
はつかだいこん	コナガキスジノミハムシ アオムシ	2500倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内			
にんにく	アザミウマ類			2500～5000倍				収穫前日まで	3回以内	3回以内
らっきょう	シロイモジヨトウ							収穫3日前まで		
あさつき		5000倍								
にら にら(花茎)	アザミウマ類	10000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内			
ねぎ	シロイモジヨトウ	2500～5000倍		収穫3日前まで						
わけぎ		5000倍								
さやいんげん さやえんどう	ハモグリバエ類	2500～5000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内					
実えんどう	アザミウマ類									
未成熟ささげ 未成熟ふじまめ										
きゅうり	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ	10000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内					
きゅうり(花)	アザミウマ類									
食用へちま	ハモグリバエ類					5000倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内	

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年9月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数	
ズッキーニ	アザミウマ類	5000～10000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
ズッキーニ(花)		5000倍			2回以内		2回以内	
とうがんすいか	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ	10000倍			3回以内		3回以内	
メロン					2回以内		2回以内	
しょくようほおずき	アザミウマ類	10000倍			3回以内		3回以内	
トマト	アザミウマ類 ハモグリバエ類 オオタバコガ	5000倍			2回以内		2回以内	
ミニトマト					2回以内		2回以内	
なす	アザミウマ類	2500～5000倍			3回以内		3回以内	3回以内
	オオタバコガ	5000倍						
ピーマン	アザミウマ類	2500～5000倍						
	オオタバコガ							
甘長とうがらし	アザミウマ類	20000倍	3回以内	3回以内		3回以内		
ししとう								
カリフラワー	コナガ	5000倍						
ブロッコリー	コナガ アオムシ	5000倍	収穫3日前まで	3回以内		4回以内（但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内）		
インサイ	アザミウマ類		収穫前日まで	2回以内	2回以内			
きゅうり(葉)	10000倍		収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
つるな	2500倍		収穫3日前まで	3回以内	3回以内			
モロヘイヤ	5000倍							

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年9月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
非結球あぶらな科葉菜類(みずな、非結球はくさいを除く)	コナガ アザミウマ類 ハモクアリハエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ類 アオムシ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
					3回以内		3回以内
非結球メキャベツ	ヨトウムシ	5000倍		収穫3日前まで	1回		1回
みずな	コナガ アザミウマ類 ハモクアリハエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ類 アオムシ				2回以内		2回以内
非結球はくさい	アオムシ	2500～5000倍		収穫7日前まで	3回以内		4回以内（但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内）
キャベツ	タマキシンウバ コナガ ヨトウムシ アオムシ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ				5000倍		3回以内
はくさい	コナガ ハイマダラノメイガ アオムシ	2500～5000倍					
	カブライハチ ヨトウムシ	5000倍					
メキャベツ	ハスモンヨトウ	2500倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
せり	アザミウマ類				3回以内		3回以内
セルリー	ハモクアリハエ類	2500倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
パセリ	ヨトウムシ				3回以内		3回以内

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年9月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
みつば	ハスモンヨトウ	5000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで (但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで)	2回以内	散布	2回以内
レタス	ハモグリバエ類	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱又はハ°-ハ°-ポット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500ml	定植前まで	1回	灌注	4回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では3回以内)
	オオタバコガ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	
	ヨトウムシ	5000倍					
非結球レタス	ハモグリバエ類	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱又はハ°-ハ°-ポット1冊(30×60cm、使用土壌約3L)当り500ml	定植前まで	1回	灌注	3回以内(但し、定植前は1回以内、本圃では2回以内)
	オオタバコガ	2500～5000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	
	ヨトウムシ	5000倍					
きく(葉)	アザミウマ類	10000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
すいぜんじな				収穫前日まで	2回以内		2回以内
よもぎ				収穫3日前まで	1回		1回
しそ科葉菜類					3回以内		3回以内
ふだんそう				ハスモンヨトウ	4000倍		

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年9月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	アザミウマ類 アシゲロハモグリバエ シロホノメイガ	5000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
アスパラガス	アザミウマ類	10000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
食用花(かんぞう(花)、食用ぎく、食用ミニバラを除く)				2回以内			2回以内
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ			3回以内			3回以内
食用ミニバラ	アザミウマ類			2回以内			2回以内
いちご				5000倍			2回以内
ゲアバ(葉)	ハンジロウツノエグリヒメハマキ	2500～5000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
クレソン	コナガ	5000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
さんしょう(葉)	アゲハ	10000倍			3回以内		3回以内
しそ(花穂)	アザミウマ類						
みょうが(花穂)		5000倍	収穫前日まで	2回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	2回以内	

スピノエース顆粒水和剤（スピノサド水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年9月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピノサドを含む農薬の総使用回数	
みょうが(茎葉)	アザミマ類	5000倍	100～300L/10a	みょうが（花穂）の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで	2回以内	散布	2回以内	
ラズベリー			200～700L/10a	収穫3日前まで				
マンゴー	チャノキイアザミマ							
いちじく	アザミマ類			収穫前日まで	1回			1回
花き類・観葉植物(きくを除く)				発生初期	2回以内			2回以内
きく	アザミマ類 ハモグリバエ類							
	オオタバコガ	2500～5000倍						
樹木類	ケムシ類	5000倍	200～700L/10a					