

ダースバンDF（クロルピリホス水和剤）

適用害虫と使用方法

2020年5月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルピリホスを含む農薬の総使用回数
かんきつ(みかんを除く)	カイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ	2000倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	1回	散布	1回
	ミカンキロアザミウマ	2000～3000倍					
みかん(施設栽培)		3000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
みかん(露地栽培)	カイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ	2000倍		収穫30日前まで			
	ミカンキロアザミウマ	3000倍		収穫14日前まで			
なし	ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	3000～4000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	シンクイムシ類	3000倍		収穫45日前まで			
りんご	ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ シンクイムシ類 ケムシ類 リンゴワタムシ			収穫45日前まで	1回		1回
かりん	ナシヒメシンクイ			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
もも	ウメシロカイガラムシ ハマキムシ類 シンクイムシ類				5回以内		5回以内
ネクタリン	ハマキムシ類 シンクイムシ類			2回以内	2回以内		
すもも	ウメシロカイガラムシ シンクイムシ類						
ブルーベリー	カイガラムシ類						
りんどう	リントウホソハマキ		100～300L/10a	-			