

ダースバン乳剤40（クロルピリホス乳剤）

適用害虫と使用方法

2021年5月26日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルピリホスを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	1500倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
てんさい	アブラムシ類 カメノコハムシ ヨトウムシ			収穫45日前まで			
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ネギハモグリバエ	1000倍					
あずき	アブラムシ類 アズキノメイガ	1500倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
だいず	マメシクイガ ハスモンヨトウ			2回以内	2回以内		
かんきつ(みかんを除く)	アブラムシ類 ハマキムシ類	1000倍	200～700L/10a	収穫60日前まで	1回	散布	1回
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫						
みかん(露地栽培)	アブラムシ類 ハマキムシ類	1500倍	20～70L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ヤノネカイガラムシ若齢幼虫 コナカイガラムシ類 クワゴマダラヒトリ幼虫	1000倍					
	カミキリムシ類幼虫	100倍					
茶	クワシロカイガラムシ	1000倍	1000L/10a	摘採14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1000～1500倍	200～400L/10a				