

ピラニカ水和剤（テブフェンピラド水和剤）

適用害虫と使用方法

2019年5月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェンピラドを含む農薬の総使用回数
かんきつ(みかんを除く)	ミカンハダニ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
	チャノホコリダニ	2000倍					
みかん	ミカンハダニ	1000～2000倍		収穫前日まで			
	チャノホコリダニ	2000倍					
なし	ニセナシハダニ	1000倍		収穫14日前まで			
	ハダニ類	1000～2000倍					
りんご	うどんこ病 ユキヤギアブラムシ リンゴサビダニ	2000倍					
	ハダニ類	1000～2000倍					
おうとう		1000倍		収穫30日前まで			
もも		1000～2000倍		収穫14日前まで			
大粒種ぶどう		2000倍		収穫30日前まで			
パパイヤ				収穫3日前まで			
マンゴー		1000倍	収穫14日前まで				
いちじく	イチジクモンサビダニ ハダニ類	2000倍	収穫7日前まで				
かき	カキサビダニ ハダニ類		収穫21日前まで				