

ファルコンフロアブル（メトキシフェノジド水和剤）

適用害虫と使用方法

2019年7月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メトキシフェノジドを含む農薬の総使用回数
キャベツ	タナキ ^ン ウハ ^ハ ヨウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	2000～4000倍	150～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	コナガ	1000倍					
	ハイマダ ^ラ ノメイガ	4000倍					
	オタバコガ	2000倍					
だいこん	ヨウムシ	4000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	
はくさい	アオムシ		150～300L/10a	収穫前日まで	2回以内		
ブロッコリー	ヨウムシ ハスモンヨトウ						
はなっこりー	ハスモンヨトウ						
トマト	オタバコガ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	ハスモンヨトウ	4000倍					
ピーマン	オタバコガ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	ハスモンヨトウ	4000倍					
なす	オタバコガ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	ハスモンヨトウ	4000倍					
ししとう	オタバコガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	ハスモンヨトウ	4000倍					
いちご	オタバコガ	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	3回以内	
	ハスモンヨトウ						
食用ぎく	ハスモンヨトウ	4000倍	200L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
ふき			100～300L/10a	収穫3日前まで			
ねぎ	シロイモジ ^ヨ トウ		150～200L/10a	収穫前日まで			

ファルコンフロアブル（メトキシフェノジド水和剤）

適用害虫と使用方法

2019年7月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メトキシフェノジドを含む農薬の総使用回数
レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍	150～300L/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
食用金魚草	ハスモンヨトウ	4000倍	150～200L/10a		3回以内		3回以内
はすいも(葉柄)		2000倍	100～150L/10a	収穫前日まで	2回以内		2回以内
つるな		4000倍	150～180L/10a	収穫3日前まで			
食用なでしこ			100～300L/10a				
非結球レタス	オオタバコガ ハスモンヨトウ						
なし	ハマキムシ類 ケムシ類	6000倍	200～700L/10a	収穫前日まで			
りんご	ヨモギエダシヤク ケムシ類			収穫21日前まで	3回以内		3回以内
	ハマキムシ類	4000～6000倍					
	キンモンホリガ	2000倍					
おうとう もも	ハマキムシ類	6000倍		収穫3日前まで			
かんしょ	ナガジロシタバ ハスモンヨトウ	4000～6000倍	100～300L/10a				
茶	ヨモギエダシヤク チャノコカクモンハマキ チャノホリガ	4000～8000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで	2回以内	2回以内	
	チャハマキ	4000倍					
	ハスモンヨトウ	8000倍					
てんさい	ヨトウムシ	4000～6000倍	100～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	