

マブリックEW（フルバリネート乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年7月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
とうもろこし	アブラムシ類	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ばれいしょ				収穫7日前まで			
やまのいも	アブラムシ類 ナガイモガ						
てんさい	ハダニ類 カメノコハムシ ヨトウムシ			収穫前日まで			
たまねぎ	ネギアザミウマ	3000～4000倍		収穫7日前まで			
豆類(種実、ただし、だ いず、あずき、らっか せいを除く)	アブラムシ類	4000倍					
あずき	アブラムシ類 ノメイガ類						
だいず	アブラムシ類 マメシクイガ						
かんきつ(みかんを除 く)	アブラムシ類 ミカンハモグリガ	2000～4000 倍	200～700L/10a	収穫45日前まで			
	カメムシ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ	2000倍					
	チャノキイロアザミウマ	4000倍					
みかん	アブラムシ類 ミカンハモグリガ	2000～4000 倍		収穫21日前まで			
	カメムシ類 ケシキスイ類 コアオハナムグリ	2000倍					
	チャノキイロアザミウマ	4000倍					


適用拡大登録月日：2024年07月10日

マブリックEW（フルバリネート乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年7月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
なし	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	カメムシ類 ナシゲンバエ ハマキムシ類 ナシホリガ モモンカイガ	2000倍					
りんご	アブラムシ類 キンモンホリガ シンクイムシ類 ヒメシロモンツクガ モモチョッキリゾウムシ						
もも	アブラムシ類	4000倍		収穫21日前まで			
	モモハモグリガ シンクイムシ類	2000倍					
うめ	アブラムシ類 オビカレハ	4000倍					
かき	イラガ類 チャノキイロアザミウマ ミノガ類			収穫30日前まで			
	カメムシ類 カキノハタムシガ	2000倍					
なたね	アオムシ		100～300L/10a	収穫14日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年07月10日