

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年9月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数		
ばれいしょ	アブラムシ類	4000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
やまのいも	アブラムシ類 ヤマノイモガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍		収穫14日前まで					
だいこん	アブラムシ類 コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ								
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000～4000倍		収穫7日前まで					
にんにく	アブラムシ類 ネギコガ	2000倍		収穫3日前まで					
さやえんどう	ヒラズハナアザミウマ	4000倍		収穫前日まで				3回以内	3回以内
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ			2回以内				2回以内	2回以内
かぼちゃ	アブラムシ類			収穫21日前まで					
すいか	ハダニ類			収穫3日前まで					
メロン				アブラムシ類				4000倍	
	ハダニ類	2000倍							
なす	アブラムシ類 オンシツコナジラミ ハダニ類	4000倍	収穫前日まで						
キャベツ	アブラムシ類	2000～4000倍	収穫14日前まで	3回以内	3回以内				
	タマキソウワバ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	1000～2000倍							

適用拡大登録月日：2023年09月27日

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年9月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	タマギンウバ コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
はくさい	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内
	タマギンウバ コナガ ヨトウムシ アオムシ	1000～2000倍					
レタス	アブラムシ類	4000倍		収穫7日前まで			
非結球レタス		収穫21日前まで					
いちご		8000倍		収穫前日まで			
かんきつ(みかんを除く)	アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ	2000～4000倍		2000倍	収穫45日前まで		
	ケンキスイ類 コアオハナムグリ ケムシ類						
みかん	アブラムシ類 カメムシ類 チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ	2000～4000倍	2000倍	収穫21日前まで			
	ケンキスイ類 コアオハナムグリ ケムシ類						
なし	アブラムシ類	2000～4000倍	2000倍	収穫30日前まで			
	キムシ類 ニホハダマシ アザミウマ アザミウマ アザミウマ アザミウマ アザミウマ アザミウマ アザミウマ						

適用拡大登録月日：2023年09月27日

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年9月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
なし	カメムシ類 ニセナシバダニ ナシグンバイ ハダニ類 ハマキムシ類 ナシチビガ ナシホリガ シンクイムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
りんご	アブラムシ類 ナミハダニ リンゴハダニ ハマキムシ類 キンモンハモグリガ キンモンホリガ シンクイムシ類 ヒメシロモントウガ モモチョッキリゾウムシ						
びわ	アブラムシ類	4000倍		収穫14日前まで			
おうとう	オウトウハマダラミバエ			収穫45日前まで			
もも	アブラムシ類	2000～4000倍		収穫21日前まで			
	ハダニ類 モモハモグリガ シンクイムシ類	2000倍					

適用拡大登録月日：2023年09月27日

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年9月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数		
うめ	アブラムシ類 モモヒメヨコバエ ケムシ類	4000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内		
かき	イラガ類 カメムシ類 チャノキアザミウマ	2000～4000倍		収穫30日前まで					
	ミノガ類	4000倍							
	カキノハタムシガ	2000倍							
キウイフルーツ	キロマイコガ			収穫7日前まで					
くり	クリシギゾウムシ クリイガ アブラムシ クリタマバチ								
	クリシギゾウムシ							40倍	2～4L/10a
		20倍	2L/10a					無人航空機による散布	
カーネーション	ハダニ類 ヨトウムシ	2000倍	100～300L/10a	発生初期				散布	
きく	アブラムシ類	2000～4000倍							
宿根かすみそう	ハダニ類	2000倍							
ストック	コナガ								
トルコギキョウ	アザミウマ類	4000倍							
ばら	アブラムシ類	2000～4000倍							
	ハダニ類	2000倍							
さくら	アメリカシロヒトリ				200～700L/10a				
つばき類	チャドクガ								
茶	コミカンアブラムシ	4000倍			200～400L/10a	摘採21日前まで			

適用拡大登録月日：2023年09月27日

マブリック水和剤20（フルバリネート水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年9月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルバリネートを含む農薬の総使用回数
茶	ヨモギイダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメコバエ	2000～4000倍	200～400L/10a	摘採21日前まで	2回以内	散布	2回以内
	カンザワハダニ チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍					
	チャノホソガ ツマゲロアオカスミカメ	2000倍					

 適用拡大登録月日：2023年09月27日