

# ランダイヤ粒剤（ダイアジノン・メソミル粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年11月24日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数	メソミルを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ナガジロシバ ハスモンヨトウ	4～6kg/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内（但し、マイクロナセル剤の植付前の処理は1回以内、マイクロナセル剤の散布は2回以内、粒剤の散布は2回以内）	5回以内
	コガネムシ類幼虫	6～9kg/10a	植付時及び生育期（但し、収穫30日前まで）	3回以内	植付時：作条処理 土壌混和 生育期：作条処理		
	ハリガネムシ類	9kg/10a	植付時（但し、収穫30日前まで）	1回	作条処理土壌混和		
だいこん	キスジノミハムシ ネキリムシ類	4～6kg/10a	は種時		作条土壌混和	2回以内（但し、生育期は1回以内）	2回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内）
にんじん	ネキリムシ類 クハネキリコバエ類	6kg/10a	は種前		全面処理土壌混和	2回以内（但し、は種前及びは種時は合計1回以内、生育期は1回以内）	2回以内（但し、は種前の土壌混和は1回以内）
キャベツ	ネキリムシ類	4～6kg/10a	は種時、定植時及び生育初期（但し、収穫30日前まで）	2回以内	作条土壌混和	2回以内	3回以内

# ランダイヤ粒剤（ダイアジノン・メソミル粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年11月24日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ダイアジノンを含む農薬の総使用回数	メソミルを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ネリムシ類	4～6kg/10a	は種時、定植時及び生育初期（但し、収穫30日前まで）	2回以内	作条土壌混和	2回以内	3回以内
はくさい			は種時	1回		1回	2回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内）
レタス			植付時			2回以内	2回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内）
リーフレタス			6kg/10a			1回	
いちご	コガネムシ類幼虫	6～9kg/10a	植付時（仮植床）		土壌混和		4回以内
芝	コガネムシ類幼虫 シバオサザウムシ シバツガ スジキリヨウ	6～10kg/10a	発生初期	4回以内	散布	4回以内	