

インダーフロアブル（フェンブコナゾール水和剤）

適用病害と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数
なし	赤星病	8000～12000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病	5000～10000倍					
	黒星病	5000～12000倍					
	輪紋病	5000倍					
りんご	赤星病 うどんこ病 黒星病	5000～12000倍	5000～12000倍	収穫14日前まで			
	褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病	5000～10000倍					
	モリア病	5000倍					
おうとう	灰星病 幼果菌核病	5000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
もも ネクタリン	黒星病 灰星病			4回以内	4回以内		
あんず	灰星病			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
うめ	黒星病 すす斑病			収穫前日まで	4回以内		
すもも	灰星病						
ぶどう	うどんこ病 褐斑病 黒とう病 灰色かび病	8000倍	収穫30日前まで	3回以内	3回以内		
ブルーベリー	灰色かび病	5000倍	収穫14日前まで	1回	1回		
かき	うどんこ病 炭疽病 落葉病		収穫7日前まで	2回以内	2回以内		


適用拡大登録月日：2024年11月13日

インダーフロアブル（フェンブコナゾール水和剤）

適用病害と使用方法

2024年11月13日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数
りんどう	葉枯病 花腐菌核病	5000倍	200～300L/10a	発病初期	5回以内	散布	5回以内
茶	網もち病 もち病		200～400L/10a	摘採7日前まで	2回以内		2回以内
	褐色円星病 炭疽病	5000～8000倍					

 適用拡大登録月日：2024年11月13日