

インダーフロアブル（フェンブコナゾール水和剤）

適用病害と使用方法

2024年11月13日現在

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|------|----------------------|
| なし | 赤星病 | 8000～12000倍 | 200～700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | うどんこ病 | 5000～10000倍 | | | | | |
| | 黒星病 | 5000～12000倍 | | | | | |
| | 輪紋病 | 5000倍 | | | | | |
| りんご | 赤星病 うどんこ病 黒星病 | 5000～12000倍 | | 収穫14日前まで | | | |
| | 褐斑病 黒点病 すす点病 すす斑病 | 5000～10000倍 | | | | | |
| | モリア病 | 5000倍 | | | | | |
| おうとう | 灰星病 幼果菌核病 | | | 収穫前日まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| もも ネクタリン | 黒星病 灰星病 | | | | 4回以内 | 4回以内 | |
| あんず | 灰星病 | | | 収穫21日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| うめ | 黒星病 すす斑病 | | | 収穫前日まで | | | |
| すもも | 灰星病 | | | | 4回以内 | 4回以内 | |
| ぶどう | うどんこ病 褐斑病 黒とう病 灰色かび病 | 8000倍 | | 収穫30日前まで | 3回以内 | 3回以内 | |
| | ブルベリー | | | 灰色かび病 | 収穫14日前まで | 1回 | 1回 |
| かき | うどんこ病 炭疽病 落葉病 | 5000倍 | | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |


適用拡大登録月日：2024年11月13日

インダーフロアブル（フェンブコナゾール水和剤）

適用病害と使用方法

2024年11月13日現在

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フェンブコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
|------|--------------|------------|--------------|---------|---------|------|----------------------|
| りんどう | 葉枯病 花腐菌核病 | 5000倍 | 200～300L/10a | 発病初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| 茶 | 網もち病 もち病 | | 200～400L/10a | 摘採7日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| | 褐色円星病 炭疽病 | 5000～8000倍 | | | | | |

 適用拡大登録月日：2024年11月13日