

# クリアターン乳剤（ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤）

適用雑草と使用方法

2011年3月2日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
小麦	一年生雑草	は種直後（雑草発生前）	全土壌（但し、砂土を除く）	400～600 ml/10a	70～100L /10a	1回	全面土壌散布	北海道	1回	1回	1回
小麦 大麦				500～700 ml/10a				北海道を除く全域			
とうもろこし				500～800 ml/10a				全域			
えだまめ		定植3日前まで（雑草発生前）		500～700 ml/10a				2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内）			
		は種直後（雑草発生前）		500～800 ml/10a							

# クリアターン乳剤（ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤）

適用雑草と使用方法

2011年3月2日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
にんじん	一年生雑草	は種直後（雑草発生前）	全土壌（但し、砂土を除く）	500～700 ml/10a	70～100L /10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	1回	2回以内 （但し、は種直後は1回以内、にんじん3～5葉期は1回以内）
だいず				500～800 ml/10a							2回以内 （但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内）

# クリアターン乳剤（ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤）

適用雑草と使用方法

2011年3月2日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
だいず	一年生雑草	定植3日前まで（雑草発生前）	全土壌（但し、砂土を除く）	500～700 ml/10a	70～100L /10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	1回	2回以内（但し、全面土壌散布は1回以内、雑草茎葉兼土壌散布は1回以内）
らっかせい		は種直後（雑草発生前）			100L/10a						1回
ばれいしょ		植付後～萌芽前（雑草発生前）		600～800 ml/10a	70～100L /10a						

# クリアターン乳剤（ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロン乳剤）

適用雑草と使用方法

2011年3月2日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンチオカーブを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
飼料用とうもろこし	一年生雑草	は種直後（雑草発生前）	全土壌（但し、砂土を除く）	500～800 mL/10a	70～100L /10a	1回	全面土壌散布	全域	1回	1回	1回