

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|--------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|
| そば | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 150～200mL/10a | 通常散布50～150L/10a、少量散布25～50L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫30日前まで） | 200mL/10a | | | | |
| キノア | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～6葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 |
| 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫30日前まで） | | | 200mL/10a | 1回 | | | | |
| かんしょ | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 1回 | | |
| こんにゃく | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫60日前まで） | | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|-------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| こんにゃく | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫60日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 1回 |
| さといも | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | | | | | |
| ばれいしょ | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫前日まで） | 200mL/10a | 100L/10a | 2回以内 | | 2回以内 |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫前日まで） | | | | | |
| やまのいも | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫60日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 1回 | | 1回 |
| | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫60日前まで） | | | | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| かぶ | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫7日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 1回 |
| ごぼう | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | | | | | |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫30日前まで） | 200mL/10a | 100L/10a | | | |
| しょうが | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫7日前まで） | 150mL/10a | 100～150L/10a | | | |
| だいこん | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫14日前まで） | 200mL/10a | 100L/10a | | | |
| | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|--------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| だいこん | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 1回 |
| ネギ（根株） | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | | | 2回以内 | | 2回以内 |
| てんさい | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫30日前まで） | 200mL/10a | 100L/10a | | | |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 150～200mL/10a | 通常散布50～150L/10a、少量散布25～50L/10a | | | |
| | | | 育苗期の雑草生育期（イネ科雑草1～3葉期）（但し、収穫30日前まで） | 150～300mL/10a（0.3～0.6mL/㎡-1㎡） -ホット6冊） | 150L/10a（300mL/㎡-1㎡） -ホット6冊） | | | |
| | シバムギ レットトップ | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 300～400mL/10a | 100～150L/10a | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|-------|------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| てんさい | - | シバムギ レットトップ | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫30日前まで) | 300~400mL/10a | 100~150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 2回以内 |
| にんじん | | 一年生イネ科雑草(スズメカビラを除く) | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫14日前まで) | 150~200mL/10a | | 1回 | | 1回 |
| | | | 雑草生育期(イネ科雑草6~8葉期)(但し、収穫14日前まで) | 200mL/10a | | | | |
| もりあざみ | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫7日前まで) | 150~200mL/10a | | | | | |
| たまねぎ | | 雑草生育期(イネ科雑草6~8葉期)(但し、収穫14日前まで) | 200mL/10a | | 2回以内 | 2回以内 | | |
| | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫14日前まで) | 150~200mL/10a | | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| たまねぎ | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 2回以内 |
| 食用ゆり | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | | | | | |
| にんにく | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫7日前まで） | | | | | |
| にら | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫前日まで） | | | | | |
| ねぎ | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 100L/10a | | | | |
| | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫30日前まで） | 200mL/10a | 100～150L/10a | | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 | |
|--------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| あずき | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 2回以内 | |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫14日前まで） | 200mL/10a | | | | | |
| 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | | | 150～200mL/10a | | | | | | |
| 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫14日前まで） | | | 200mL/10a | | | | | | |
| いんげんまめ | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 2回以内 | |
| 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫14日前まで） | | | 200mL/10a | | | | | | |
| えんどうまめ | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 150～200mL/10a | | 1回 | | | 1回 |
| だいず | | | | | | | | | 通常散布50～150L/10a、少量散布25～50L/10a |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------------|-------------------|
| だいず | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | 150～200mL/10a | 通常散布50～150L/10a、少量散布25～50L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草9～10葉期）（但し、収穫30日前まで） | 250～300mL/10a | 100～150L/10a | | | |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫30日前まで） | 200mL/10a | 通常散布50～100L/10a、少量散布25～50L/10a | | | |
| べにばないんげん | - | - | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫60日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | - | - | - |
| らっかせい | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫90日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | | | |
| 豆類（未成熟） かぼちゃ すいか トマト | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|-------------------------------|------|-----------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| 豆類(未成熟) かぼちゃ すいか トマト | - | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫14日前まで) | 150~200mL/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 1回 |
| カリフラワー | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫7日前まで) | | | | | |
| ブロッコリー | | | 雑草生育期(イネ科雑草6~8葉期)(但し、収穫7日前まで) | 200mL/10a | 100L/10a | | | |
| ブロッコリー 非結球あぶらな科 葉菜類 | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫7日前まで) | 150~200mL/10a | 100~150L/10a | | | |
| キャベツ | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫14日前まで) | | | | | |
| | | | 雑草生育期(イネ科雑草6~8葉期)(但し、収穫14日前まで) | 200mL/10a | 100L/10a | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|------|------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| キャベツ | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫14日前まで） | 200mL/10a | 100L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 1回 |
| はくさい | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | | | |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫14日前まで） | 200mL/10a | 100L/10a | | | |
| せり | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫60日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 | 2回以内 |
| セルリー | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～6葉期）（但し、収穫28日前まで） | | | | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | |
| レタス | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫7日前まで） | | | 1回 | | 1回 | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|--------|------|-----------------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------|-------------------|
| はっか | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | 150～200mL/10a | 100L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 2回以内 |
| ほうれんそう | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫7日前まで） | | 100～150L/10a | 1回 | | 1回 |
| アスパラガス | | | 雑草生育期（イネ科雑草6～8葉期）（但し、収穫前日まで） | 200mL/10a | 100L/10a | 2回以内 | | 2回以内 |
| | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫前日まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | | | |
| いちご | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫開始14日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 2回以内 | | 2回以内 |
| ぎぼうし | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫75日前まで） | | | | | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|------------|------|-----------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| ぎぼうし | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫75日前まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 2回以内 |
| チリ | | | 根株養成期の雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、根株掘上30日前まで） | | | | | |
| やまのいも（むかご） | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫14日前まで） | | | | | |
| おうぎ | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～6葉期） | 100L/10a | 1回 | 2回以内 | | 2回以内 |
| おけら | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～5葉期）（但し、収穫30日前まで） | | | | | |
| しゃくやく（薬用） | | | 雑草生育期（イネ科雑草3～6葉期）（但し、収穫60日前まで） | | 10回以内（但し、1年間に2回以内） | 10回以内（但し、1年間に2回以内） | | |

 適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 | | | | |
|-----------|------|-----------------------|--------------------------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| しゃくやく(薬用) | - | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期(イネ科雑草3~6葉期)(但し、収穫60日前まで) | 150~200mL/10a | 100L/10a | 10回以内(但し、1年間に2回以内) | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 10回以内(但し、1年間に2回以内) | | | | |
| せんきゅう | | | | | | 100~150L/10a | | 2回以内 | 2回以内 | | | |
| とうき | | | | | | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~6葉期)(但し、収穫14日前まで) | 4回以内(但し、1年間に2回以内) | 4回以内(但し、1年間に2回以内) | | |
| とりかぶと(薬用) | | | | | | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫14日前まで) | | | | |
| みしまさいこ | | | | | | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~6葉期)(但し、収穫30日前まで) | | | | |
| きく | | | | | | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) | | | 3回以内 | 3回以内 |
| りんどう | | | | | | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~6葉期) | | | 1回 | 1回 |
| わた | | | | | | | | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) | | | | |
| 樹木類 | | | | | | | | 100L/10a | | | 3回以内 | 3回以内 |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------------|-------------------|
| すぎ(床替床) ひのき(床替床) | - | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) | 150~200mL/10a | 100~150L/10a | 3回以内 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 3回以内 |
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地等 | | | 150~400mL/10a | 100~200L/10a | | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | |
| | | ススキ カヤ | 雑草生育期(草丈40cm) | 500~1000mL/10a | 150~200L/10a | | 植栽地を除く樹木等の周辺地に局所散布 | |
| なたね | - | 一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く) | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期)(但し、収穫60日前まで) | 150~200mL/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉散布 又は全面散布 | 1回 |
| いぐさ | 雑草生育期(イネ科雑草3~5葉期) | | | | 3回以内 | | 3回以内 | |
| 桑 | 雑草生育期(草丈20~30cm) | | 200~250mL/10a | 150~200L/10a | | 雑草茎葉散布 | | |
| たばこ | 雑草生育期(但し、植付10日前まで、又は植付後10日から大土寄期まで) | | 150~200mL/10a | 100~150L/10a | 1回 | 雑草茎葉畦面散布 | 1回 | |

適用拡大登録月日：2023年11月07日

ナブ乳剤（セトキシジム乳剤）

適用雑草と使用方法

2023年11月7日現在

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 薬量 | 希釈水量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | セトキシジムを含む農薬の総使用回数 |
|-----|------|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------|----------|-------------------|
| たばこ | - | 一年生イネ科雑草（スズメノカタビラを除く） | 雑草生育期（但し、植付10日前まで、又は植付後10日から大土寄期まで） | 150～200mL/10a | 100～150L/10a | 1回 | 雑草茎葉畦面散布 | 1回 |

 適用拡大登録月日：2023年11月07日