スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
稲	-	ｳﾝｶ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ	1000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内（但し、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）
		ｳﾝｶ類 ｶﾒﾑｼ類	300倍	25L/10a				
			30倍	3L/10a			空中散布	
			8倍	0.8L/10a				
							無人航空機による散布	
		ｳﾝｶ類 ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ	16倍	1.6L/10a				
		ｳﾝｶ類	30倍	3L/10a				
水田作物、畑作物（休耕田）	ﾖｼ、ｵｷﾞ、ｽｽｷ、ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ等の多年生雑草が優占している休耕田	ｶﾒﾑｼ類	1000倍	60～150L/10a	-		散布	3回以内
だいこん	-	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8～16倍	1.6L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	5回以内（但し、は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内）

スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
だいこん	-	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8～16倍	1.6L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	5回以内（但し、は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内）

スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
だいこん	-	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8～16倍	1.6L/10a	収穫7日前まで	2回以内	無人航空機による散布	5回以内（但し、は種時の播溝土壌混和は1回以内、は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布は1回以内、水溶剤の散布、液剤の散布及び無人航空機散布は合計2回以内）
らっきょう		ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類	8倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内
ねぎ		ｱｻﾞﾐｳﾏ類	10～16倍		収穫3日前まで	2回以内		4回以内（但し、は種時の土壌混和、育苗ﾄﾚｲへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）

スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法

2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
ねぎ	-	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	10～16倍	1.6L/10a	収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	4回以内（但し、は種時の土壌混和、育苗ﾄﾚｲへの灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、生育期の株元灌注は1回以内、散布、無人航空機散布及び定植後の株元散布は合計2回以内）
だいず		ｶﾒﾑｼ類 ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで		散布	3回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）

スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
だいず	-	ｶﾒﾑｼ類 ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内（但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）
			8倍	0.8L/10a			空中散布 無人航空機による散布	
えだまめ			1000倍	100～300L/10a			散布	
			8倍	0.8L/10a			空中散布 無人航空機による散布	
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ		ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8～16倍	1.6L/10a	収穫3日前まで			3回以内（但し、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）

スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	-	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8～16倍	1.6L/10a	収穫3日前まで	2回以内	無人航空機による散布	3回以内（但し、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）
ｷｬﾍﾞﾂ								3回以内（但し、育苗期の株元散布、定植時の土壌混和及び灌注は合計1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内）
いね科牧草			1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内

スタークル液剤１０（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法　　2021年12月22日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝを含む農薬の総使用回数
さとうきび	-	ｲﾅｺﾞ類 ｶﾝｼｬｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	5回以内（但し、粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内）
			14倍	2.4L/10a			無人航空機による散布	