

# スタークル液剤10（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法

2020年11月25日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
稲	-	ウカ類 カメムシ類 ツマゲロヨコバイ	1000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内（ 但し、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）	
			ウカ類	300倍					25L/10a
			カメムシ類	30倍					3L/10a
				8倍					0.8L/10a
			ウカ類	30倍					3L/10a
			ウカ類 カメムシ類	8倍					0.8L/10a
	ウカ類 ツマゲロヨコバイ	16倍	1.6L/10a						
水田作物、畑作物（休耕田）	ヨシ、オギ、ススキ、セトウカワガチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメムシ類	1000倍	60～150L/10a	-		散布	3回以内	

# スタークル液剤10（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法

2020年11月25日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数			
らっきょう	-	アザミウマ類 ハモグリバエ類	8倍	1.6L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内			
だいち		カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダズサヤタマバエ	1000倍	100～300L/ 10a					2回以内	散布	3回以内（ 但し、は種 時の土壌混 和は1回以 内、散布は 2回以内）
		カメムシ類 ダズサヤタマバエ	8倍	0.8L/10a							
えだまめ		カメムシ類 フタスジヒメハムシ ダズサヤタマバエ	1000倍	100～300L/ 10a					2回以内	散布	2回以内
		カメムシ類 ダズサヤタマバエ	8倍	0.8L/10a							
いね科牧草		アブラムシ類	1000倍	100～300L/ 10a					3回以内	散布	3回以内
さとうきび		イナゴ類 カンシャコバネカカメムシ									

# スタークル液剤10（ジノテフラン液剤）

適用害虫と使用方法

2020年11月25日現在

作物名	適用場所	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
さとうきび	-	付コ類 カンジャコバ ネガ カメムシ	14倍	2.4L/10a	収穫45日前まで	3回以内	無人航空機による散布	5回以内（但し、粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び水和剤は合計3回以内）