スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
稲	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ｶﾒﾑｼ類 ｲﾈｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ ｲﾈﾂﾄﾑｼ ｱﾜﾖﾄｳ	1000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し､種もみへの処理は1回以内､育苗箱散布は1回以内､本田では2回以内)
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ｶﾒﾑｼ類 ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾆｶﾒｲﾁｭｳ ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ ｲﾈﾂﾄﾑｼ	30倍	3L/10a			空中散布	
	ｶﾒﾑｼ類 ﾆｶﾒｲﾁｭｳ	300倍	25L/10a			散布	
		8倍	800mL/10a			空中散布	
						無人航空機による散布	
	ｲﾈｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ	1000倍	-	は種前	1回	6～72時間浸漬	
		100倍				専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理	
	ｲﾈﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第1世代	1000～2000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
稲	ｲﾈﾋﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ	2500倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)
	ｻﾝｶﾒｲﾁｭｳ第3世代 ﾆｶﾒｲﾁｭｳ第2世代	800～1000倍					
	ﾌﾀｵﾋﾞｺﾔｶﾞ	2000～4000倍					
稲(箱育苗)	ｲﾈｼﾝｶﾞﾚｾﾝﾁｭｳ	1000倍	育苗箱(60×30×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500mL	硬化期～移植前日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	
麦類(大麦、小麦を除く)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾑｷﾞｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ｱﾜﾖﾄｳ		60～150L/10a	収穫14日前まで		散布	1回
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ﾑｷﾞｱｶﾀﾏﾊﾞｴ	30倍	3L/10a			空中散布	
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ	8倍	800mL/10a				
小麦	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾑｷﾞｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ｱﾜﾖﾄｳ	1000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで		散布	
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	250倍	25L/10a				

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
小麦	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8倍	800mL/10a	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布	1回
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ﾑｷﾞｱｶﾀﾏﾊﾞｴ	30倍	3L/10a			空中散布	
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ	8倍	800mL/10a				
大麦	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾑｷﾞｷﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ｱﾜﾖﾄｳ	1000倍	60～150L/10a			散布	
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ					空中散布	
	ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ ﾑｷﾞｱｶﾀﾏﾊﾞｴ	30倍	3L/10a				
とうもろこし	ｶﾒﾑｼ類 ｱﾜﾉﾒｲｶﾞ ﾂﾏｼﾞﾛｸｻﾖﾄｳ	1000倍	100～300L/10a		4回以内	散布	4回以内
かんしょ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾖﾂﾓﾝｶﾒﾉｺﾊﾑｼ ｲﾓｺｶﾞ				5回以内		5回以内
こんにゃく	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
ばれいしょ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ類			収穫3日前まで	6回以内		6回以内
	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	250倍	25L/10a				
ごぼう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾌｷﾉﾒｲｶﾞ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
ごぼう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾌｷﾉﾒｲｶﾞ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
てんさい	ﾃﾝｻｲﾄﾋﾞﾊﾑｼ	1000倍					
たまねぎ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫21日前まで			
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	700～1000倍					
らっきょう		1000倍		収穫7日前まで			3回以内(但し、植付前は1回以内、植付後は2回以内)
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ	8倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
	ﾈﾀﾞﾆ類	1000～2000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬	
にら		1000倍	3L/平方ﾒｰﾄﾙ	収穫14日前まで		株元灌注	1回
ねぎ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍	100～300L/10a		2回以内	散布	2回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	700～1000倍					
	ﾈｷﾞｺｶﾞ	1000倍					
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、そらまめを除く)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
あずき	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
あずき	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	250倍	25L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾎｿｸﾁｿﾞｳﾑｼ ﾅﾐﾊﾀﾞﾆ ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ｱｽﾞｷﾉﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍	100～300L/10a				
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
いんげんまめ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ｶﾒﾑｼ類 ｲﾝｹﾞﾝﾏﾒｿﾞｳﾑｼ ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
そらまめ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
だいず		1000～2000倍		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	20倍	3L/10a			空中散布	

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
だいず	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	20倍	3L/10a	収穫21日前まで	4回以内	空中散布	4回以内
	ｶﾒﾑｼ類 ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍	100～300L/10a			散布	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
えだまめ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
えだまめ	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ｳｺﾝﾉﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
さやいんげん	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ｶﾒﾑｼ類 ｲﾝｹﾞﾝﾃﾝﾄｳ ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
未成熟そらまめ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
	ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒﾋﾒｻﾔﾑｼｶﾞ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾏﾀﾞﾗﾒｲｶﾞ ﾀﾞｲｽﾞｻﾔﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
	ﾏﾒｼﾝｸｲｶﾞ	1000～1500倍					
きゅうり	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000倍					
しろうり	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000倍					
かぼちゃ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	700～1000倍					

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
すいか	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	6回以内	散布	6回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	700～1000倍					
ﾒﾛﾝ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000倍					
ﾄﾏﾄ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ	2000倍			2回以内		2回以内
なす	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ類	1000～2000倍			5回以内		5回以内
ﾓﾛﾍｲﾔ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾏﾒｺｶﾞﾈ ｱｻﾞﾐｳﾏ類	1000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
せり	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	2000倍		親株養成期(但し、収穫45日前まで)			
ほうれんそう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾎｳﾚﾝｿｳｹﾅｶﾞｺﾅﾀﾞﾆ	1000～2000倍		収穫21日前まで			
うど	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ ﾋﾒｼﾛｺﾌﾞｿﾞｳﾑｼ ｳﾄﾞﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ	1000倍		根株養成期(但し､収穫150日前まで)	4回以内		4回以内
わらび	ﾅｶﾞｾﾞﾝﾏｲﾊﾊﾞﾁ			収穫90日前まで	2回以内		2回以内
いちご	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	2000倍		収穫前日まで			
ｵﾘｰﾌﾞ(葉)	ｵﾘｰﾌﾞｱﾅｱｷｿﾞｳﾑｼ	50倍	0.3～3L/樹	収穫120日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
たらのき	ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ幼虫 ﾋﾒｼﾛｺﾌﾞｿﾞｳﾑｼ	100倍	150～300L/10a	3月～5月(株養成期)	2回以内		2回以内

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
たらのき	ｾﾝﾉｶﾐｷﾘ幼虫 ﾋﾒｼﾛｺﾌﾞｿﾞｳﾑｼ	100倍	150～300L/10a	3月～5月（株養成期）	2回以内	樹幹散布	2回以内
ｾﾈｶﾞ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
かんきつ（みかんを除く）		1000～2000倍	200～700L/10a				3回以内（但し、樹幹処理は1回以内）
	ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ ｹｼｷｽｲ類 ｶﾈﾀﾀｷ ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾐｶﾝﾂﾎﾞﾐﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					
みかん	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍			5回以内		5回以内（但し、樹幹処理は1回以内）
	ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ ｹｼｷｽｲ類 ｶﾈﾀﾀｷ ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾐｶﾝﾂﾎﾞﾐﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
みかん	ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ ｹｼｷｽｲ類 ｶﾈﾀﾀｷ ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾌﾗｰﾊﾞﾗｼﾞｳﾑｼ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾐｶﾝﾂﾎﾞﾐﾀﾏﾊﾞｴ	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	ｹｼｷｽｲ類 ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ｱｻﾞﾐｳﾏ類	10倍	5L/10a			無人航空機による散布	
なし(有袋栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍	200～700L/10a		6回以内	散布	6回以内
	ｶﾒﾑｼ類 ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾅｼﾁﾋﾞｶﾞ ﾅｼﾎｿｶﾞ ｼﾝｸｲﾑｼ類 ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍					
	ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	1500倍					
なし(無袋栽培)	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫21日前まで			
	ｶﾒﾑｼ類 ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾅｼﾁﾋﾞｶﾞ ﾅｼﾎｿｶﾞ ｼﾝｸｲﾑｼ類 ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍					
	ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	1500倍					
りんご	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍					

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
りんご	ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	1500倍					
おうとう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内)
	ﾅｼｸﾞﾝﾊﾞｲ ﾊﾏｷﾑｼ類 ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍					
もも	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾓﾓﾊﾓｸﾞﾘｶﾞ ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ(心折防止)	1000～2000倍		収穫3日前まで	6回以内		6回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	ｸﾜｼﾛｶｲｶﾞﾗﾑｼ ｶﾒﾑｼ類 ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾓﾓｼﾝｸｲｶﾞ ﾅｼﾋﾒｼﾝｸｲ	1000倍					
	ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ			成虫発生初期(但し、収穫3日前まで)			
	ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	1500倍		収穫3日前まで			
うめ	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
うめ	ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ	1000倍	200～700L/10a	成虫発生初期（但し、収穫14日前まで）	2回以内	散布	2回以内
	ﾊﾏｷﾑｼ類 ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ			収穫14日前まで			
大粒種ぶどう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾌﾞﾄﾞｳｽｶｼﾊﾞ ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾘﾊﾞ	1000～2000倍		収穫21日前まで			4回以内（但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内）
	ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾗｶﾐｷﾘ ｷﾝｹｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ成虫 ﾊﾏｷﾑｼ類	1000倍					
	ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	1500倍					
小粒種ぶどう	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ﾌﾞﾄﾞｳｽｶｼﾊﾞ ﾌﾀﾃﾝﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾘﾊﾞ	1000～2000倍		収穫90日前まで			
	ﾌﾞﾄﾞｳﾄﾗｶﾐｷﾘ ｷﾝｹｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ成虫 ﾊﾏｷﾑｼ類	1000倍					
	ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ	1500倍					
ｵﾘｰﾌﾞ	ｵﾘｰﾌﾞｱﾅｱｷｿﾞｳﾑｼ	50倍	0.3～3L/樹	収穫21日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
いちょう（種子）	ｺｳﾓﾘｶﾞ ﾋﾒﾎﾞｸﾄｳ	100倍		収穫60日前まで			
かき	ｲﾗﾀﾞ類 ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾐｶﾞ類若齢幼虫 ｶｷﾉﾊﾞ ｶｷﾉﾊﾑｼｶﾞ ｱﾒﾘｶﾝｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで		散布	3回以内（但し、樹幹処理は2回以内）

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
かき	ｲﾗｶﾞ類 ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類 ｶﾒﾑｼ類 ﾊﾏｷﾑｼ類 ﾐﾉｶﾞ類若齢幼虫 ｶｷﾎｿｶﾞ ｶｷﾉﾍﾀﾑｼｶﾞ ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内(但し､樹幹処理は2回以内)
くり	ﾓﾓﾉｺﾞﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	8倍	3L/10a	収穫14日前まで	4回以内	空中散布	4回以内(但し､樹幹処理は1回以内)
花き類･観葉植物	ﾊﾞｯﾀ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ﾊﾏｷﾑｼ類 ｱｵﾑｼ	1000倍	100～300L/10a	-	6回以内	散布	6回以内
ｱｽﾀｰ	ｳﾘﾊﾑｼ						
ｶｰﾈｰｼｮﾝ	ｱｻﾞﾐｳﾏ類 ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ						
ききょう	ﾖﾄｳﾑｼ						
きく	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ｶﾒﾑｼ類 ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ ﾖﾄｳﾑｼ類	1000倍					
ｼﾈﾗﾘｱ	ｼﾝｸｲﾑｼ類						
宿根かすみそう	ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ類						
ｽﾀｰﾁｽ	ｺｶﾞﾈﾑｼ類						

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
ｿﾘﾀﾞｺﾞ	ｶﾒﾑｼ類	1000倍	100～300L/10a	-	6回以内	散布	6回以内
ばら	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	1000～2000倍					
	ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ	1000倍					
斑入りｱﾏﾄﾞｺﾛ	ｺｳﾓﾘｶﾞ						
りんどう	ﾋﾗｽﾞﾊﾅｱｻﾞﾐｳﾏ			発生初期			
樹木類	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ類 ﾌﾗｰﾊﾞﾗｿﾞｳﾑｼ		200～700L/10a	-			
	ｵｵﾊﾘｾﾝﾁｭｳ	500倍	-	移植前	1回	30分間根部浸漬	
	ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ	500～1000倍	200～700L/10a	-	6回以内	散布	
しきみ	ｸｽｱﾅｱｷｿﾞｳﾑｼ	1000倍					
こでまり	ｶｲｶﾞﾗﾑｼ類						
さかき	ﾊﾏｷﾑｼ類 ｻｶｷﾌﾞﾁﾋﾒﾖｺﾊﾞｲ						
にしきぎ	ｹﾑｼ類						
さくら	ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ			成虫発生初期			
さんごじゅ	ﾜﾀﾉﾒｲｶﾞ			-			
しゃりんばい	ｼﾝｸｲﾑｼ類						
せんりょう	ｶﾒﾑｼ類 ｱｻﾞﾐｳﾏ類						
げっきつ	ﾐｶﾝｷｼﾞﾗﾐ						
つつじ類	ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ類 ﾊﾏｷﾑｼ類						
だいおうしょう	ｼﾝｸｲﾑｼ類						

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2025年8月27日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
芝	ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫	1000倍	3L/平方ﾒｰﾄﾙ	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	ｼﾊﾞｵｻｿﾞｳﾑｼ			幼虫発生期			
	ｼﾊﾞﾂﾄｶﾞｽｼﾞｷﾘﾖﾄｳ		0.3～2L/平方ﾒｰﾄﾙ	発生初期			
いね科牧草	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾝｶ類 ｿﾞｳﾑｼ類 ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ ﾖｺﾊﾞｲ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	ﾑｷﾞﾀﾞﾆ ｱﾜﾖﾄｳ	1000倍					
まめ科牧草	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｳﾝｶ類 ｿﾞｳﾑｼ類 ｳﾘﾊﾑｼﾓﾄﾞｷ ﾖｺﾊﾞｲ類	1000～2000倍					
	ﾑｷﾞﾀﾞﾆ	1000倍					
飼料用とうもろこし	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類	2000倍		収穫30日前まで			
茶	ｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ ﾁｬﾉﾎｿｶﾞ	700～1000倍	200～400L/10a	摘採21日前まで	1回		1回
	ﾐﾉｶﾞ類	1000倍					
桑	ｸﾜｿﾞｳﾑｼ成虫	500～750倍	100～300L/10a	成虫発生期	6回以内		6回以内
しちとうい	ｲﾈｸﾛｶﾒﾑｼ	1000倍	60～150L/10a	発生初期	2回以内		2回以内
たばこ	ﾖﾄｳﾑｼ		25～180L/10a	収穫20日前まで	1回		1回

適用拡大登録月日：2025年08月27日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

2025年8月27日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数又は使用量	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
水田作物、畑作物（休耕田）	ﾖｼ、ｵｷﾞ、ｽｽｷ、ｾｲﾀｶｱﾜﾀﾞﾁｿｳ等の多年生雑草が優占している休耕田	ｶﾒﾑｼ類	1000倍	60～150L/10a	4回以内	散布	4回以内

適用拡大登録月日：2025年08月27日