

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数		
稲	アブラムシ類 ヒメトビウンカ カメムシ類 イネシガレセンチュウ イネトコイムシ イネツトムシ アワヨトウ	1000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)		
	ヒメトビウンカ カメムシ類 イネハモグサリハエ イネヒメハモグサリハエ ニカメイチュウ フタオビコヤガ イネツトムシ	30倍	3L/10a			空中散布			
	カメムシ類 ニカメイチュウ	300倍	25L/10a			散布			
		8倍	800mL/10a			空中散布 無人航空機による散布			
	イネシガレセンチュウ	1000倍	-			は種前		1回	6～72時間浸漬
		100倍							専用の種子消毒機を用いて乾燥種籾重量の3%の量の希釈液を種籾に吹付け処理又は塗沫処理
	イネハモグサリハエ ニカメイチュウ第1世代	1000～2000倍	60～150L/10a			収穫21日前まで		2回以内	散布
	イネヒメハモグサリハエ	2500倍							

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
稲	サカメイトウ第3世代 ニカメイトウ第2世代	800～1000倍	60～150L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、種もみへの処理は1回以内、育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)
	フタバゴヤガ	2000～4000倍					
稲(箱育苗)	イネシガレシチュウ	1000倍	育苗箱(60×30×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500mL	硬化期～移植前日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	1回
麦類(大麦、小麦を除く)	アブラムシ類 ムギキモグリハエ アワヨトウ	8倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	1回	散布	
	アブラムシ類		800mL/10a			無人航空機による散布	
	ヒメトビウカ ムギアカタマバエ		30倍			3L/10a	空中散布
	ヒメトビウカ		800mL/10a				
小麦	アブラムシ類 ムギキモグリハエ アワヨトウ	1000倍	60～150L/10a	収穫7日前まで	1回	散布	
	アブラムシ類	250倍	25L/10a			無人航空機による散布	
		8倍	800mL/10a				
	ヒメトビウカ					空中散布	
	ヒメトビウカ ムギアカタマバエ	30倍	3L/10a				
大麦	アブラムシ類 ムギキモグリハエ アワヨトウ	1000倍	60～150L/10a			散布	

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
大麦	アブラムシ類	8倍	800mL/10a	収穫7日前まで	1回	無人航空機による散布	1回
	ヒメビウカ					空中散布	
	ヒメビウカ ムギアカタマバエ	30倍	3L/10a				
とうもろこし	カメムシ類 アワノメイガ ツマシロクサヨトウ	1000倍	100～300L/10a		4回以内	散布	4回以内
かんしょ	アブラムシ類 ヨツモンカメノコハムシ イモガ				5回以内		5回以内
こんにゃく	アブラムシ類				3回以内		3回以内
ばれいしょ	アブラムシ類 テントウムシダマシ類				6回以内		6回以内
	アブラムシ類	250倍	25L/10a				
ごぼう	アブラムシ類 フキノメイガ	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内
たまねぎ	アブラムシ類			収穫21日前まで			
	アザミウマ類	700～1000倍					
らっきょう		1000倍		収穫7日前まで			3回以内(但し、植付前は1回以内、植付後は2回以内)
	アザミウマ類 ネギハモグリバエ	8倍	1.6L/10a			無人航空機による散布	
	ネダニ類	1000～2000倍	-	植付前	1回	30分間種球浸漬	

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
ねぎ	アブラムシ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミマ類	700～1000倍					
	ネギコガ	1000倍					
豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、そらまめを除く)	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫21日前まで	4回以内		4回以内
	カメムシ類 マヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ ダイスヤタマハエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
あずき	アブラムシ類	1000～2000倍	25L/10a				
		250倍					
	カメムシ類 マメホリクチゾウムシ ナミハダニ マヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ アズキノメイガ ダイスヤタマハエ	1000倍	100～300L/10a				
	マメシクイガ	1000～1500倍					
いんげんまめ	アブラムシ類	1000～2000倍					
		カメムシ類 インゲンテントウ マヒメサヤムシガ シロイチモジマダラメイガ ダイスヤタマハエ					
	マメシクイガ	1000～1500倍					

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
そらまめ	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
だいず		1000～2000倍	0a	収穫21日前まで	4回以内		4回以内
	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイチモジ マダラメイガ ウコンノメイガ マメハンミョウ ダース サヤタマハエ	1000倍					
	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイチモジ マダラメイガ マメシクイガ ダース サヤタマハエ	20倍	3L/10a			空中散布	
	カメムシ類 ダース サヤムシガ シロイチモジ マダラメイガ ウコンノメイガ マメシクイガ ダース サヤタマハエ	8倍	800mL/10a			無人航空機による散布	
	マメシクイガ	1000～1500倍	100～300L/10a			散布	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、未成熟そらまめを除く)	アブラムシ類	1000～2000倍	0a				
	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイチモジ マダラメイガ ダース サヤタマハエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
えだまめ	アブラムシ類	1000～2000倍					

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
えだまめ	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイモジマダラメイガ ウコンノメイガ ダイスサヤタマバエ	1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	4回以内	散布	4回以内
	マメシクイガ	1000～1500倍					
さやいんげん	アブラムシ類	1000～2000倍					
	カメムシ類 インゲンテントウ マメヒメサヤムシガ シロイモジマダラメイガ ダイスサヤタマバエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
未成熟そらまめ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫3日前まで	3回以内		3回以内
	カメムシ類 マメヒメサヤムシガ シロイモジマダラメイガ ダイスサヤタマバエ	1000倍					
	マメシクイガ	1000～1500倍					
きゅうり	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	アザミウマ類	1000倍					
しろうり	アブラムシ類	1000～2000倍					
	アザミウマ類	1000倍					
かぼちゃ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	3回以内		3回以内
	アザミウマ類	700～1000倍					
すいか	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫3日前まで	6回以内		6回以内

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
すいか	アザミウマ類	700～1000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	6回以内	散布	6回以内
メロン	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫前日まで	5回以内		5回以内
	アザミウマ類	1000倍					
トマト	アブラムシ類	2000倍			2回以内		2回以内
	オオニジユウヤホシテントウ						
なす	アブラムシ類	1000～2000倍			5回以内		5回以内
	テントウムシダマシ類						
モロヘイヤ	アブラムシ類 カメムシ類 マメコガネ アザミウマ類	1000倍		収穫14日前まで	2回以内	2回以内	
せり	アブラムシ類	2000倍		親株養成期(但し、 収穫45日前まで)			
ほうれんそう	アブラムシ類 ホウレンソウケナガコナダニ	1000～2000倍		収穫21日前まで			
うど	アブラムシ類 センノカミキリ ヒメシロコブゾウムシ ウドノメイガ ヨトウムシ	1000倍		根株養成期(但し、 収穫150日前まで)	4回以内	4回以内	
				収穫90日前まで	2回以内	2回以内	
わらび	ナガゼンマイハバチ			収穫前日まで			
いちご	アブラムシ類	2000倍		収穫前日まで			
オリーブ(葉)	オリーブアナアキゾウムシ	50倍	0.3～3L/樹	収穫120日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
たらのぎ	センノカミキリ幼虫 ヒメシロコブゾウムシ	100倍	150～300L/10a	3月～5月(株養成期)	2回以内		2回以内
セネガ	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
かんきつ(みかんを除く)	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	サンホーゼカイガラムシ カメムシ類 ミカンキジラミ ケシキスイ類 カネタタキ コアオハナムゲリ アザミウマ類 フラーバラゾウムシ ハマキムシ類 コナカイガラムシ類 ミカンツボミタマバエ	1000倍					
みかん	アブラムシ類	1000～2000倍	5L/10a	5回以内	5回以内	散布	5回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	サンホーゼカイガラムシ カメムシ類 ミカンキジラミ ケシキスイ類 カネタタキ コアオハナムゲリ アザミウマ類 フラーバラゾウムシ ハマキムシ類 コナカイガラムシ類 ミカンツボミタマバエ	1000倍					
	ケシキスイ類 コアオハナムゲリ アザミウマ類	10倍			無人航空機による散布		

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
なし(有袋栽培)	アブラムシ類	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	6回以内	散布	6回以内
	カメムシ類 ナシゲンバイ ハマキムシ類 ナシチビガ ナシホソガ シンクイムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
なし(無袋栽培)	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫21日前まで			
	カメムシ類 ナシゲンバイ ハマキムシ類 ナシチビガ ナシホソガ シンクイムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
りんご	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	ナシゲンバイ ハマキムシ類 モモシンクイガ ナシヒメシンクイ アメリカシロヒトリ	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
おうとう	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内)


適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
おうとう	ナシゲンバイ ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ	1000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内(但し、樹幹処理及び灌注処理は合計1回以内)
もも	アブラムシ類 モモハモグリガ ナシヒメシクイ(心折防止)	1000～2000倍		収穫3日前まで	6回以内		6回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
	クワコナカイガラムシ カメムシ類 ハマキムシ類 モモシクイガ ナシヒメシクイ	1000倍		成虫発生初期(但し、収穫3日前まで)			
	クビアカツヤカミキリ						
	クワコナカイガラムシ	1500倍		収穫3日前まで			
うめ	アブラムシ類	1000～2000倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
	クビアカツヤカミキリ	1000倍		成虫発生初期(但し、収穫14日前まで)			
	ハマキムシ類 アメリカシロヒトリ			収穫14日前まで			

 適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
大粒種ぶどう	アブラムシ類 ブドウスカシバ フタテンヒメヨコバエ ブドウトリバ	1000～2000倍	200～700L/10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	4回以内(但し、収穫終了後から萌芽までは2回以内、萌芽後は2回以内)
	ブドウウラカミキリ キンケチブトゾウムシ成虫 ハマキムシ類	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
小粒種ぶどう	アブラムシ類 ブドウスカシバ フタテンヒメヨコバエ ブドウトリバ	1000～2000倍		収穫90日前まで			
	ブドウウラカミキリ キンケチブトゾウムシ成虫 ハマキムシ類	1000倍					
	クワコナカイガラムシ	1500倍					
オリブ	オリブアナアキゾウムシ	50倍	0.3～3L/樹	収穫21日前まで	3回以内	樹幹散布	3回以内
いちょう(種子)	コウモリガ ヒメホクトリ	100倍		収穫60日前まで			
かき	イラガ類 カメムシ類 ハマキムシ類 ミノガ類若齢幼虫 オオワタコナカイガラムシ フジコナカイガラムシ カキホソガ カキノハタムシガ アメリカシロヒトリ	1000倍	200～700L/10a	収穫30日前まで		散布	3回以内(但し、樹幹処理は2回以内)

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
くり	モモゴマダノメイガ	8倍	3L/10a	収穫14日前まで	4回以内	空中散布	4回以内(但し、樹幹処理は1回以内)
花き類・観葉植物	ハッパ類 アザミウマ類 ハマキムシ類 アトムシ	1000倍	100～300L/10a	-	6回以内	散布	6回以内
アスター	ウリハムシ						
カーネーション	アザミウマ類 クロウリハムシ						
ききょう	ヨトウムシ						
きく	アブラムシ類	1000～2000倍					
	カメムシ類 フラハラゾウムシ ヨトウムシ類	1000倍					
シネリア	シンクイムシ類						
宿根かすみそう	ハモグリバエ類						
スターチス	コガネムシ類						
ソリタゴ	カメムシ類						
ばら	アブラムシ類	1000～2000倍					
	フラハラゾウムシ	1000倍					
斑入りアマトコロ	コウモリガ						
りんどう	ヒラスハナアザミウマ			発生初期			
樹木類	アブラムシ類 ゲンバイムシ類 フラハラゾウムシ		200～700L/10a	-			

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数			
樹木類	オオハレセンチュウ	500倍	-	移植前	1回	30分間根部浸漬	6回以内			
	アメリカシロヒトリ	500～1000倍	200～700L/10a	-	6回以内	散布				
しきみ	クスアナキゾウムシ	1000倍		-				-		
こでまり	カイガラムシ類									
さかき	ハマキムシ類 サカキゾチヒメヨコバイ									
にしきぎ	ケムシ類									
さくら	クビアカツヤカミキリ								成虫発生初期	
さんごじゅ	ワタノメガ								-	
しゃりんばい	シクイムシ類									
せんりょう	カメムシ類 アザミウマ類									
げっきつ	ミカンジラミ									
つつじ類	ゲンバヒムシ類 ハマキムシ類									
だいおうしょう	シクイムシ類									
芝	コガネムシ類幼虫								3L/平方メートル	発生初期
	シバオサゾウムシ									幼虫発生期
	シバツトガ スジキリヨウ		発生初期							
いね科牧草	アブラムシ類 ウカ類 ゾウムシ類 ウリハムシトドギ ヨコバイ類	1000～2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内			

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤（MEP乳剤）

適用害虫と使用方法

2024年4月24日現在


作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
いね科牧草	ムギダニ アブコブ	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
まめ科牧草	アブラムシ類 ウカ類 ゾウムシ類 ウリハムシモドキ ヨコバイ類	1000～2000倍					
	ムギダニ	1000倍					
飼料用とうもろこし	アブラムシ類	2000倍		収穫30日前まで			
茶	コカモンハマキ チャノホリガ	700～1000倍	200～400L/10a	摘採21日前まで	1回		1回
	ミノガ類	1000倍					
桑	クワゾウムシ成虫	500～750倍	100～300L/10a	成虫発生期	6回以内		6回以内
しちとうい	イネカメムシ	1000倍	60～150L/10a	発生初期	2回以内		2回以内
たばこ	ヨトウムシ		25～180L/10a	収穫20日前まで	1回		1回

適用拡大登録月日：2024年04月24日

スミチオン乳剤 (MEP乳剤)

2024年4月24日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用液量	本剤の使用回 数	使用方法	MEPを含む農薬 の総使用回数
水田作物、畑作物(休 耕田)	ヨシ、オギ、ス キ、セイカアワ ヅリ等の 多年生雑 草が優占 している 休耕田	カメシ類	1000倍	60~150L/10a	4回以内	散布	4回以内

 適用拡大登録月日：2024年04月24日