

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	苗立枯病(リゾフス菌)	1000~2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1L	は種時~緑化期(但し、は種14日後まで)	2回以内	土壌灌注	2回以内
		500~1000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り500mL				
ばれいしょ	疫病	16倍	100~300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内
	疫病		3.2L/10a			無人航空機による散布	
	夏疫病		1.6L/10a			散布	
やまのいも	炭疽病 つる枯病 葉渋病	1000倍	100~300L/10a	収穫30日前まで	6回以内		6回以内
				収穫前日まで			
しょうが	白星病 紋枯病	16倍	3.2L/10a	収穫14日前まで	5回以内	無人航空機による散布	5回以内
しょうが	白星病						
だいこん	白さび病 炭疽病 白斑病 ワッカ症	1000倍	100~300L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内
てんさい	褐斑病			収穫30日前まで			
にんじん	黒葉枯病	8倍	1.6L/10a	収穫7日前まで	5回以内	無人航空機による散布	5回以内(但し、種子への吹き付け処理は1回以内)
		16倍	3.2L/10a				

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
にんじん	黒葉枯病	12倍	乾燥種子1kg 当り60mL	は種前	1回	吹き付け処理(種子消毒機使用)	5回以内(但し、種子への吹き付け処理は1回以内)
もりあざみ	ステムフィリウム葉枯症	1000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内
たまねぎ	灰色かび病 白色疫病 べと病			収穫7日前まで	6回以内		6回以内
食用ゆり	葉枯病			収穫14日前まで			
にんにく	黄斑病 さび病 葉枯病 白斑葉枯病			収穫7日前まで			
らっきょう	灰色かび病			収穫14日前まで	3回以内		3回以内
ねぎ	黒斑病 さび病 葉枯病 べと病 小菌核腐敗病					4回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)	
	苗立枯病(リゾクトニア菌)	500倍	セル成型育苗トレイ11箱又はペーパポット1冊(30×60cm、使用土壌約5L)当り0.5L	出芽揃い後(出芽3日後～10日後まで)	1回	土壌灌注	

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
ねぎ	苗立枯病(リゾクトニア菌)	500倍	セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約5L)当り0.5L	出芽揃い後(出芽3日後～10日後まで)	1回	土壌灌注	4回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
			0.5L/平方メートル				
わけぎ	黒斑病 さび病 葉枯病 べと病 小菌核腐敗病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布は2回以内)
	苗立枯病(リゾクトニア菌)						
らっかせい	褐斑病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)	うどんこ病 炭疽病 つる枯病 べと病			収穫前日まで			
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 黒星病 炭疽病 灰色かび病 べと病				12回以内		14回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)

 適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数								
きゅうり	苗立枯病(リゾクトニア菌)	1000倍	3L/平方メートル	は種時又は活着後(但し、定植14日後まで)	2回以内	土壌灌注	14回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)								
ズッキーニ	うどんこ病							100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
にがうり	うどんこ病 炭疽病 つる枯病 斑点病 べと病												4回以内	5回以内	5回以内
ゆうがお	うどんこ病 炭疽病 べと病														
かぼちゃ	うどんこ病 白斑病 べと病												5回以内	5回以内	
すいか	炭疽病							700倍	収穫3日前まで	5回以内	5回以内				
	つる枯病	700~1000倍													
メロン	うどんこ病	700倍													
	つる枯病	1000倍													
	べと病	700~1000倍													

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	うどんこ病 疫病 すすかび病 炭疽病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 輪紋病 褐色輪紋病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	6回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
	苗立枯病(リゾクトニア菌)			3L/平方メートル		は種時又は活着後(但し、定植14日後まで)	
ミニトマト	うどんこ病 疫病 すすかび病 炭疽病 灰色かび病 葉かび病 斑点病 輪紋病 褐色輪紋病		100～300L/10a	収穫前日まで		散布	2回以内

 適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
なす	うどんこ病 黒枯病 すすかび病 灰色かび病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
ピーマン	うどんこ病 黒枯病 炭疽病 斑点病				3回以内		
カリフラワー	べと病			出蕾前(但し、収穫14日前まで)			
ブロッコリー	根こぶ病		3L/平方メートル	定植時	1回	土壌灌注	3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
	べと病		100～300L/10a	出蕾前(但し、収穫21日前まで)	2回以内	散布	
みずな	立枯病		3L/平方メートル	は種時	1回	土壌灌注	1回
なばな類(なばなを除く)	黒斑病 白さび病 白斑病 べと病		100～300L/10a	収穫60日前まで	3回以内	散布	3回以内
なばな				出蕾前(但し、収穫21日前まで)			

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数	
なばな	黒斑病 白さび病 白斑病 べと病	1000倍	100～300L/10a	出蕾前(但し、収穫21日前まで)	3回以内	散布	3回以内	
非結球はくさい	白斑病			収穫28日前まで	2回以内		2回以内	
キャベツ	べと病 根朽病			収穫14日前まで			3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計2回以内)	
はくさい	黒斑病 白さび病 白斑病 べと病			収穫7日前まで				3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
あしたば	黒枯病			収穫30日前まで				3回以内
セルリ-	斑点病 萎縮炭疽病				収穫21日前まで		2回以内	2回以内
みつば	べと病				根株養成期(但し、収穫75日前まで)		3回以内	3回以内
レタス	すそ枯病 灰色かび病 べと病				収穫14日前まで			5回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
レタス	すそ枯病 灰色かび病 べと病	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	5回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
	ビクバイン病		1.5～3L/平方メートル	収穫42日前まで		2回以内	
非結球レタス	すそ枯病 べと病		100～300L/10a	収穫21日前まで		散布	2回以内
しそ	斑点病(株枯症)		150L/10a	収穫前日まで	4回以内	株元散布	4回以内
アスパラガス	疫病 褐斑病 茎枯病 斑点病		100～400L/10a			散布	
うど	黒斑病		100～300L/10a	根株養成期(但し、収穫200日前まで)	3回以内		4回以内(但し、散布は3回以内、根株瞬間浸漬は1回以内)
ふき	灰色かび病			収穫21日前まで	2回以内		2回以内
食用ぎく	褐斑病			収穫30日前まで	4回以内		4回以内
オクラ	葉すす病			収穫前日まで	5回以内		5回以内

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数	
やまのいも(むかご)	炭疽病 つる枯病 葉渋病	1000倍	100~300L/10a	収穫45日前まで	6回以内	散布	6回以内	
みょうが(花穂)	葉枯病 紋枯病			収穫14日前まで	4回以内		みょうが(花穂)の 収穫14日前まで 但し、花穂を収穫 しない場合にあって は開花期終了まで	4回以内
みょうが(茎葉)								
しゃくやく(薬用)	うどんこ病			収穫45日前まで	15回以内(但し、1年間に3回以内)		15回以内(但し、1年間に3回以内)	
せんぶり	さび病			収穫7日前まで	12回以内(但し、1年間に6回以内)		12回以内(但し、1年間に6回以内)	
みしまさいこ	炭疽病			800倍	収穫30日前まで		3回以内	3回以内
なし	黒星病 黒斑病	1000倍	200~700L/10a	収穫45日前まで				
りんご	黒星病 斑点落葉病 モニリア病							
マルメロ	ごま色斑点病			収穫30日前まで	4回以内	4回以内		
かりん	黒点病 ごま色斑点病 白かび斑点病			収穫45日前まで	3回以内	3回以内		

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
かりん	黒点病 ごま色斑点病 白かび斑点病	1000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内
もも	黒星病			収穫前日まで	6回以内		
ネクリン	灰星病				2回以内		
パパイア	炭疽病				5回以内		
パッションフルーツ	疫病 円斑病			収穫14日前まで	3回以内		
いちじく	疫病 黒かび病 黒葉枯病 さび病	2000倍		収穫前日まで	2回以内		2回以内
キウイフルーツ	果実軟腐病			500～1000倍	収穫60日前まで		
	すす斑病	500倍					
花き類・観葉植物(ばら、きく、フェリツ、ゆり、りんどうを除く)	うどんこ病 斑点病	1000倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	6回以内		6回以内
きく	うどんこ病 褐斑病 黒斑病 白さび病 斑点病						
フェリツ	褐色斑点病						

適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

適用病害と使用方法

2024年6月26日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
ばら	うどんこ病 黒星病 斑点病	1000倍	100～300L/10a	発病前～発病初期	6回以内	散布	6回以内
ゆり	葉枯病 斑点病						
りんどう	褐斑病 葉枯病						
しきみ	炭疽病						
つつじ類	褐斑病		200～700L/10a				
西洋芝(バーミュダグラス) 西洋芝(ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病	500～750倍	1L/平方メートル	発病初期	8回以内		8回以内
茶	網もち病 褐色円星病	1000倍	200～400L/10a	摘採10日前まで	1回		1回
	新梢枯死症(輪斑病菌による) 炭疽病 もち病 輪斑病	700～1000倍					
	灰色かび病 黒葉腐病	700倍					
たばこ	うどんこ病	700～1000倍	25～150L/10a	収穫10日前まで	2回以内		2回以内

 適用拡大登録月日：2024年06月26日

ダコニール1000 (TPN水和剤)

2024年6月26日現在

作物名	適用場所	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
きゅうり	温室、ガラス室、ビニルハウス等の密閉できる場所	べと病	33倍	10L/10a	収穫前日まで	12回以内	常温煙霧	14回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計12回以内)
トマト		うどんこ病 すすかび病 葉かび病 褐色輪紋病				4回以内		6回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
なす		うどんこ病	4回以内			4回以内		
ピーマン		50倍	3回以内			3回以内		
アスパラガス		褐斑病 斑点病	40倍			4回以内		4回以内

適用拡大登録月日：2024年06月26日