

# ダコレート水和剤（ベノミル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	いもち病(苗いもち)	400倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時	1回	灌注	2回以内(但し、種子への処理は1回以内、床土への混和は1回以内)	2回以内
	苗立枯病(リゾ-フス菌)	800～1200倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1L	は種時～緑化期(但し、は種14日後まで)	2回以内			
	苗立枯病(トリコデルマ菌)							
苗立枯病(フザリウム菌)	400～600倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L						
たまねぎ	灰色かび病	800倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	6回以内	散布	8回以内(但し、種子粉衣は1回以内、育苗培土混和、灌注又は苗根部浸漬は合計1回以内、散布は6回以内)	6回以内
ブロッコリー	菌核病 べと病	1000倍		出蕾前(但し、収穫21日前まで)	2回以内		4回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)	3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)

適用拡大登録月日：2024年04月24日

# ダコレート水和剤（ベノミル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数		
ブロッコリー	菌核病 べと病	1000倍	100～300L/ 10a	出蕾前(但し、 収穫21日前まで)	2回以内	散布	4回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種後は3回以内)	3回以内(但し、土壌灌注は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)		
キャベツ	菌核病 べと病 根朽病			収穫14日前まで					7回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種後は6回以内)	3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布、無人航空機散布及びエアリアル剤の噴射は合計2回以内)
はくさい	菌核病 黒斑病 べと病			収穫7日前まで					3回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)	3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)

適用拡大登録月日：2024年04月24日

# ダコレート水和剤（ベノミル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
はくさい	菌核病 黒斑病 べと病	1000倍	100～300L/ 10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種後は2回以内)	3回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計2回以内)
レタス	すそ枯病 灰色かび病 べと病	1500倍		収穫14日前まで	3回以内		5回以内(但し、種子粉衣は1回以内、は種後は4回以内)	5回以内(但し、土壌灌注は2回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内)
アスパラガス	茎枯病 斑点病	1000倍	100～500L/ 10a	収穫終了後	4回以内			4回以内
もも	黒星病 すすかび病 枝折病		200～700L/ 10a	収穫3日前まで	3回以内		3回以内	6回以内
	灰星病 柿 <sup>°</sup> シ腐敗病 果実赤点病	1000～1500倍						

適用拡大登録月日：2024年04月24日

# ダコレート水和剤（ベノミル・TPN水和剤）

適用病害と使用方法

2024年4月24日現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
もも	灰星病 幹アブラムシ 果実赤点病	1000～1500倍	200～700L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内

適用拡大登録月日：2024年04月24日