

各位

全2ページ
登録速報(2018-125)
2018年4月25日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2018年4月25日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第14493号
名称 クミアイダコレート水和剤

2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」に以下の作物を追加し別紙【変更後】のとおりとする。

【追加事項】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
レタス	べと病 灰色かび病	1500倍	100~300 L/10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	5回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は4回 以内)	5回以内(土壌 灌注は2回以 内、散布は3 回以内)
キャベツ	根朽病 菌核病	1000倍			2回以内		7回以内(種子粉衣 は1回以内、 は種後は6回以 内)	3回以内(は種 又は定植前の 土壌混和は1 回以内、散布及 びエアゾル剤 の噴射は合計 2回以内)
はくさい	黒斑病			収穫7日前 まで	3回以内(種子粉衣 は1回以内、は種 後は2回以内)		3回以内(は種 又は定植前の 土壌混和は1 回以内、散布は 2回以内)	

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容なし

別紙

【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ベノミルを含む 農薬の総使用回数	TPNを含む 農薬の総使 用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 (苗いもち)	400 倍	育苗箱 (30× 60×3cm、使 用土壌約 5L) 1 箱当り 0.5L	は種時	1 回	灌注	2 回以内 (種子への 処理は 1 回以内、 床土への混和は 1 回以内)	2 回以内
	苗立枯病 (リゾブス菌)	400~600 倍	育苗箱 (30× 60×3cm、使 用土壌約 5L) 1 箱当り 1L	は種時から 緑化期但し、 は種 14 日後 まで	2 回以内			
	苗立枯病 (トリコテリウム菌)							
もも	灰星病 ホモシス腐敗病 果実赤点病	1000~ 1500 倍	200~700 L/10a	収穫 3 日前 まで	3 回以内	散布	3 回以内	6 回以内
	黒星病 枝折病 すすかび病	1000 倍						
アスパラガス	茎枯病 斑点病	1000 倍	100~500 L/10a	収穫終了後	4 回以内			
たまねぎ	灰色かび病	800 倍	100~300 L/10a	収穫 7 日前 まで	6 回以内	8 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 育苗培土混和、 灌注または 苗根部浸漬は 合計 1 回以内、 散布は 6 回以内)	6 回以内	
<u>レタス</u>	べと病 灰色かび病	1500 倍	100~300 L/10a	収穫 14 日前 まで	3 回以内	5 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 4 回以内)	5 回以内 (土 壌灌注は 2 回 以内、散布は 3 回以内)	
<u>キャベツ</u>	根朽病 菌核病	1000 倍			2 回以内	7 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 6 回以内)	3 回以内 (は 種又は定植 前の土壌混 和は 1 回以 内、散布及び エアゾル剤 の噴射は合 計 2 回以内)	
<u>はくさい</u>	黒斑病			3 回以内 (種子粉衣は 1 回以内、は種後は 2 回以内)	3 回以内 (は 種又は定植 前の土壌混 和は 1 回以 内、散布は 2 回以内)			

以上