

各位

全4ページ  
登録速報(2019-224)  
2019年 9月25日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2019年 9月25日

## 記

### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第23554号

名称： クミアイベネビアOD

### 2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を変更し、【変更後】のとおりとする。

- ・ 作物名「はくさい」に、適用病害虫名「キスジノミハムシ」を、希釈倍数「2000倍」にて追加する。
- ・ 作物名「だいこん」に、適用病害虫名「ダイコンサルハムシ」を、希釈倍数「2000～4000倍」にて追加する。
- ・ 作物名「トマト」及び「ミニトマト」に、適用病害虫名「アザミウマ類」を、希釈倍数「2000倍」にて追加する。
- ・ 作物名「かんしょ」に、適用病害虫名「ヨツモンカメノコハムシ」を、希釈倍数「4000倍」にて追加する。
- ・ 作物名「たまねぎ」に、適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を、希釈倍数「2000倍」にて追加する。
- ・ 作物名「ねぎ」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数について、「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)」を「4回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))」に変更する。
- ・ 作物名「非結球レタス」を下記のとおりに追加する。

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	シアントラニリブ <sup>®</sup> ロール を含む農薬の 総使用回数
非結球レタス	材 <sup>カ</sup> ハ <sup>カ</sup> ハ <sup>カ</sup> モン <sup>カ</sup> ヨ <sup>カ</sup> ト <sup>カ</sup> ヨ <sup>カ</sup> ト <sup>カ</sup> ム <sup>カ</sup>	2000~4000 倍	100~ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)
	ハ <sup>カ</sup> モ <sup>カ</sup> リ <sup>カ</sup> ハ <sup>カ</sup> エ <sup>カ</sup> 類 ア <sup>カ</sup> ブ <sup>カ</sup> ラム <sup>カ</sup> シ <sup>カ</sup> 類	2000 倍					

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用 方法	シアントリリ <sup>®</sup> ロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ <sup>®</sup> ラノメイガ <sup>®</sup> ウバ <sup>®</sup> 類 オタバ <sup>®</sup> コガ <sup>®</sup>	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (定植時までの 処理は1回以内、 定植後の散布は 3回以内)
	アザ <sup>®</sup> ミウマ <sup>®</sup> 類 アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類	2000 倍					
<u>はくさい</u>	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダ <sup>®</sup> ラノメイガ <sup>®</sup>	2000～ 4000 倍					
	アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類 <u>キスジ<sup>®</sup> ノミハムシ<sup>®</sup></u>	<u>2000 倍</u>					
<u>だいこん</u>	コナガ アオムシ ハイマダ <sup>®</sup> ラノメイガ <sup>®</sup> カブ <sup>®</sup> ラバ <sup>®</sup> チ <u>ダイコンサルハムシ<sup>®</sup></u>	<u>2000～ 4000 倍</u>					
	アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類 ハモグ <sup>®</sup> リバ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> 類 キスジ <sup>®</sup> ノミハムシ <sup>®</sup>	2000 倍					
	ヨトウムシ	4000 倍					
ブロッコリー	アオムシ ハスモンヨトウ コナガ	2000～ 4000 倍					
	アザ <sup>®</sup> ミウマ <sup>®</sup> 類 アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類	2000 倍					
<u>トマト</u> <u>ミニトマト</u>	オタバ <sup>®</sup> コガ <sup>®</sup>	2000～ 4000 倍					
	アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類 コナジ <sup>®</sup> ラミ <sup>®</sup> 類 <u>アザ<sup>®</sup> ミウマ<sup>®</sup> 類</u> ハモグ <sup>®</sup> リバ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> 類	<u>2000 倍</u>					
きゅうり	アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類 コナジ <sup>®</sup> ラミ <sup>®</sup> 類 アザ <sup>®</sup> ミウマ <sup>®</sup> 類 ハモグ <sup>®</sup> リバ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> 類 ウリノメイガ <sup>®</sup>						
レタス <u>非結球レタス</u>	オタバ <sup>®</sup> コガ <sup>®</sup> ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～ 4000 倍					
	ハモグ <sup>®</sup> リバ <sup>®</sup> エ <sup>®</sup> 類 アブ <sup>®</sup> ラムシ <sup>®</sup> 類	2000 倍					

(つづき)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリプロール を含む農薬の 総使用回数			
ピーマン	材タバコガ	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	4 回以内 (定植時までの 処理は 1 回以内、 定植後の散布は 3 回以内)			
	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000 倍								
いちご	ハスモンヨトウ	2000～ 4000 倍						4 回以内(灌注 は 1 回以内、 散布は 3 回以内)		
	えだまめ			ハスモンヨトウ マメシクイガ						
だいず	アブラムシ類	2000 倍		収穫 7 日前 まで			3 回以内	散布	3 回以内	
	ハスモンヨトウ マメシクイガ	2000～ 4000 倍								
<u>ねぎ</u>	シロイモジヨトウ アザミウマ類 ハモクリバエ類	<u>2000 倍</u>		収穫前日 まで			収穫 14 日 前まで	3 回 以内	散布	<u>4 回以内</u> ( <u>定植時までの</u> <u>処理は 1 回以内、</u> <u>定植後の処理は</u> <u>3 回以内</u> ( <u>但し、株元灌注</u> <u>は 1 回以内</u> ))
<u>たまねぎ</u>	<u>シロイモジヨトウ</u> ハスモンヨトウ アザミウマ類 ハモクリバエ類									
やまのいも	ナガイモコガ ハスモンヨトウ アブラムシ類	<u>4000 倍</u>		収穫 7 日前 まで			3 回以内	散布	3 回以内	
<u>かんしょ</u>	ハスモンヨトウ ナカシロシタバ アリトビキゾウムシ <u>ヨツモンカメノコハムシ</u>									
ばれいしょ	ハスモンヨトウ アブラムシ類									
かぼちゃ	ハモクリバエ類 ハスモンヨトウ	2000 倍 4000 倍	収穫前日 まで	収穫 10 日前 まで	2 回以 内	2 回以内				
たばこ	ヨトウムシ	4000 倍	100～ 180L/10a							

以上