

各位

全3ページ
登録速報(2025-121)
2025年7月9日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部 普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2025年7月9日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第24169号

名称：ツイゲキ1キロ粒剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第6項中、以下を変更する。

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名「一年生雑草、多年生広葉雑草、イノハヤブガサ、アミドロ・藻類による表層はく離」を「一年生雑草、多年生雑草、アミドロ・藻類による表層はく離」に変更する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	一年生雑草 <u>多年生雑草</u> <u>アミドロ・藻類による表層はく離</u>	移植後14日 (稲5葉期以降) ~ ノビエ4葉期 但し、 収穫60日前まで	1kg/10a	1回	湛水散布 又は無人航空機による 散布

シメリンを 含む農薬の総使用回数	ピリミスルファンを 含む農薬の総使用回数	フェンキトリアンを 含む農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第7項中、以下の2)を変更し、別紙【変更後】のとおりとする。

【変更後】

2) 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカはヘラ葉1葉期まで、ホタルイは草丈20cmまで、ミズガヤツリ、ウリカワは5葉期まで、クログワイ、シズイ、コウキヤガラは草丈30cmまで、オモダカは矢尻葉4葉期まで、キシウスズメノヒエは再生茎4葉期まで、エゾノサヤヌカグサは4葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生初期まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは増殖期までが本剤の散布適期である。

7. 農薬の使用上の注意事項（8に掲げる事項を除く。）

【変更後】

- 1) 使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- 2) 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカはヘラ葉1葉期まで、ホタルイは草丈20cmまで、ミズガヤツリ、ウリカワは5葉期まで、クログワイ、シズイ、コウキヤガラは草丈30cmまで、オモダカは矢尻葉4葉期まで、キシユウスズメノヒエは再生茎4葉期まで、エゾノサヤヌカグサは4葉期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生初期まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは増殖期までが本剤の散布適期である。
- 3) オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイに有効な前処理剤との組み合わせで使用することで、より高い効果が得られる。
- 4) 5葉期末満の稲に対しては薬害を生じるおそれがあるため、使用をさけること。
- 5) 苗の植付けが均一となるように、代かきおよび植付作業はていねいにおこなうこと。未熟有機物を施用した場合は、特にていねいにおこなうこと。
- 6) 散布の際は、水の出入りを止めて湛水状態のまま田面に均一に散布し、散布後3～4日間は通常の湛水状態（水深3～5cm）を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。また、入水は静かにおこなうこと。
- 7) 以下のような条件下では薬害が発生するおそれがあるため使用をさけること。
 - ①砂質土壌の水田および漏水田（減水深が2cm/日以上）
 - ②極端な浅植えの水田および浮き苗の多い水田
- 8) 直播水稻に使用する場合は以下に注意すること。
 - ①発芽直後の稲に対して薬害を生じるおそれがあるため、適切な覆土をおこない、稲の5葉期以降に散布すること。
 - ②稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるため使用をさけること。
 - ③除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるため、入水後水持ちの安定した後に散布すること。
- 9) 梅雨時期等、散布後に多量の降雨が予想される場合は、除草効果が低下するおそれがあるため使用をさけること。
- 10) 無人航空機で散布する際は以下に注意すること。
 - ①散布は使用機種の使用基準に従って実施すること。
 - ②専用の粒剤散布装置によって湛水散布すること。
 - ③事前に薬剤の物理性に合せて粒剤散布装置の開度を調整すること。
 - ④散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m以上離してほ場内に散布すること。
 - ⑤水源池、飲料用水などに飛散、流入しないよう十分注意すること。
- 11) 散布した水田の田面水を他の作物の灌水に使用しないこと。
- 12) 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるため、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分に注意すること。
- 13) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。