

各位

全4ページ
登録速報(2026-068)
2026年5月13日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2026年5月13日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第16590号
名称 クミアイアグロスリン乳剤

2. 変更の内容

- ・作物名「だいず」の適用病害虫名「ジャガイモヒゲナガアブラムシ」を「アブラムシ類」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、使用方法「無人航空機による散布」の使用液量「2.4L/10a」を「2.4~3.2L/10a」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」および「わけぎ」の適用病害虫名「ネギハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「にら」、「にら(花茎)」、「葉にんにく」および「らっきょう」の適用病害虫名「ネギアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。
- ・作物名「トマト」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に変更する。
- ・作物名「なす」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に、「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「きゅうり」の適用病害虫名「オンシツコナジラミ」を「コナジラミ類」に、「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「トマトハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000~2000倍」に変更する。
- ・作物名「すいか」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

- ・作物名「メロン」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に、「トマトハモグリバエ」を「ハモグリバエ類」に変更し、希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ミナミキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更、希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更し、適用病害虫名「ハクサイダニ」を追加する。
- ・作物名「かんきつ」の適用病害虫名「チャノキイロアザミウマ」を「アザミウマ類」に変更する。

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	シ ^o ルトリン を含む 農薬の 総使用回数
<u>だいず</u>	<u>アブラムシ類</u> カメムシ類 フタスジヒメハムシ マメシクイガ	2000倍	100~300 L/10a	収穫7日 前まで	3回 以内	散布	3回以内
<u>たまねぎ</u>	<u>アザミウマ類</u> <u>ハモク^oリハ^oエ類</u> シロイモシヨトウ	48倍	<u>2.4~3.2</u> <u>L/10a</u>		5回 以内		
<u>ねぎ</u>	<u>アザミウマ類</u> シロイモシヨトウ			1000倍			
	<u>わけぎ</u>	<u>アザミウマ類</u> <u>アブラムシ類</u> <u>ハモク^oリハ^oエ類</u> ネギコガ	<u>1000~</u> <u>2000倍</u>	1000倍	収穫3日 前まで	2回 以内	2回以内
<u>にら</u>		<u>アザミウマ類</u> クハネキノコハ ^o エ類 ハモク ^o リハ ^o エ類 ヨトウムシ類 ネギコガ	2000倍				
<u>にら</u> <u>(花茎)</u>				100~300 L/10a	収穫7日 前まで	3回 以内	3回以内
<u>葉にんにく</u>				収穫前日 まで			
<u>らっきょう</u>	<u>アザミウマ類</u>			収穫3日 前まで	5回 以内	散布	5回以内
<u>トマト</u>	<u>アブラムシ類</u> <u>コナジラミ類</u>			収穫前日 まで			
<u>なす</u>	<u>アザミウマ類</u>	1000倍	1000倍	収穫前日 まで	5回 以内	散布	5回以内
	<u>アブラムシ類</u> <u>コナジラミ類</u>	<u>1000~</u> <u>2000倍</u>					
<u>きゅうり</u>	<u>アザミウマ類</u> <u>ハモク^oリハ^oエ類</u>	1000倍	1000倍	収穫前日 まで	5回 以内	散布	5回以内
	<u>アブラムシ類</u> <u>コナジラミ類</u>	<u>1000~</u> <u>2000倍</u>					
<u>すいか</u>	<u>アザミウマ類</u> <u>アブラムシ類</u>						
<u>メロン</u>	<u>アザミウマ類</u> <u>ハモク^oリハ^oエ類</u>	1000倍	1000倍	収穫前日 まで	5回 以内	散布	5回以内
	<u>アブラムシ類</u>	<u>1000~</u> <u>2000倍</u>					
<u>ほうれんそう</u>	<u>アザミウマ類</u>	1000倍	1000倍	収穫7日 前まで	5回 以内	散布	5回以内
	<u>アブラムシ類</u> <u>ハクサイダ^oニ</u> ヨトウムシ	<u>1000~</u> <u>2000倍</u>					

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液 量	使用時 期	本剤 の 使用 回数	使用方法	シアルトリン を含む 農薬の 総使用回数
<u>かんきつ</u>	<u>アザミウマ類</u> アブラムシ類 カメムシ類 ケシキイ類 コアオハナムケ リ ミカンハモク リガ	1000～ 2000 倍	200～ 700 L/10a	収穫 7 日前ま で	3 回 以内	散布	3 回以内

以上