登 録 速 報

農 薬 名:クミアイラビライト水和剤(登録番号:第 11996 号)

適用拡大登録月日:平成27年2月4日

適用拡大登録内容:

●作物名「りんご」の適用病害虫名「うどんこ病」及び「褐斑病」の希釈倍数を「500~600 倍」 に変更する。

【変更前】(変更作物のみ)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | チオファネートメチルを 含む農薬の 総使用回数 | マンネブ を 含む農薬の 総使用回数 |
|-----|---------------------|---------------|------------------|----------------|-------------|----------|---|--------------------------|
| りんご | すす点病 すす斑病 | 500 倍 | 200~700 L/10a | 収穫 60 日 前まで | 2 回以内 | | 10 回以内 (塗布は3回以内、 灌注は1回以内、 散布は6回以内) | 2 回以内 |
| | うどんこ病 褐斑病 黒点病 | 600 倍 | | | | | | |
| | 黒星病 斑点落葉病 輪紋病 | 500~ 600 倍 | | | | | | |

【変更後】(変更作物のみ)

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の 使用回数 | 使用 方法 | チオファネートメチルを含 む農薬の 総使用回数 | マンネブ・を 含む農薬の 総使用回数 |
|-----|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------|--|--------------------------|
| りんご | すす点病 すす斑病 | 500 倍 | -200∼700 L/10a | 収穫 60 日 前まで | 2 回以内 | 散布 | 10回以内 (塗布は3回以内、 灌注は1回以内、 散布は6回以内) | 2 回以内 |
| | 黒点病 | 600 倍 | | | | | | |
| | うどんこ病 褐斑病 黒星病 斑点落葉病 輪紋病 | 500~ 600 倍 | | | | | | |

注意事項の変更:なし