

## 登 録 速 報

農 薬 名：ナギナタ 1キログラム剤（登録番号：第 23115 号）

適用拡大登録月日：平成 25 年 8 月 7 日

適用拡大登録内容：

- ① 適用雑草名「ウリカワ(近畿・中国・四国)、オモダカ(東北)、クログワイ(東北)」を追加する。
- ② 使用方法「湛水散布」および「田植同時散布機で施用」の適用地帯「全域(北陸を除く)の普通期及び早期栽培地帯」に、適用土壌「砂壤土」を追加する。

(変更後) 全内容

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツハイ ホタルイ ウリカワ	移植直後～ ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	砂壤土 ～ 埴土	1kg /10a	1 回	湛水散布	全域の 普通期及び 早期栽培地帯
	ミスガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ(北海道、東北) ヒルムシロ セリ オモダカ(東北) クログワイ(東北)	移植時				田植同時 散布機で 施用	

オキサジクロメリンを含む 農薬の総使用回数	ピリミスルファンを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピシクロンを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内

注意事項の変更：

【変更事項】

[変更前]

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの 2.5 葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ(北陸は発生始期まで)、ウリカワ(東北、北陸、関東・東山・東海は発生始期まで)は 2 葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。

[変更後]

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの 2.5 葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ(東北、北陸、近畿・中国・四国は発生始期まで)は 2 葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、オモダカ、クログワイは発生始期までが本剤の散布適期である。

【追加事項】

- オモダカ、クログワイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないなので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

以 上