

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイ アグロスリン乳剤（登録番号：第 16590 号）

適用拡大登録月日：平成24年11月21日

適用拡大登録内容：

- ① 作物名「かんきつ」の本剤の使用回数およびシペルメトリンを含む農薬の総使用回数「5回以内」を「3回以内」に変更する。
- ② 作物名「非結球レタス」の使用時期「収穫14日前まで」を「収穫7日前まで」、本剤の使用回数およびシペルメトリンを含む農薬の総使用回数「5回以内」を「2回以内」に変更する。
- ③ 作物名「しそ(花穂)」を削除する。
- ④ 作物名「はっか」を「しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)」に変更する。
- ⑤ 作物名「バジル」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫3日前まで」、本剤の使用回数およびシペルメトリンを含む農薬の総使用回数「1回」を「2回以内」に変更する。
- ⑥ 作物名「食用プリムラ」「食用金魚草」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫14日前まで」、本剤の使用回数およびシペルメトリンを含む農薬の総使用回数「1回」を「2回以内」に変更する。
- ⑦ 作物名「ほうれんそう」の使用時期「収穫7日前まで」を「収穫21日前まで」に変更する。
- ⑧ 作物名「かんきつ」「キウイフルーツ」「しきみ」「さかき」の使用液量を「200~700L/10a」とする。
- ⑨ 作物名「麦類」の使用液量を「60~150L/10a」とする。
- ⑩ 作物名「たばこ」の使用液量を「25~180L/10a」とする。
- ⑪ 作物名「飼料用えんばく(は種用種子)」の希釈倍数「300倍(使用量は種子1kg当り希釈液20mL)」を「300倍」に、使用液量を「種子1kg当り希釈液20mL」とする。
- ⑫ 作物名「とうもろこし」「だいず」「えだまめ」「あずき」「いんげんまめ」「さやいんげん」「きゅうり」「すいか」「メロン」「かぼちゃ」「トマト」「なす」「ピーマン」「いちご」「ねぎ」「たまねぎ(使用方法：散布)」「にんじん」「にら」「にら(花茎)」「ごぼう」「ほうれんそう」「チンゲンサイ」「こまつな」「さぬきな」「レタス」「非結球レタス」「しそ」「食用ぎく」「きく」「カーネーション」「しそ科葉菜類(しそ、バジルを除く)」「バジル」「食用プリムラ」「食用金魚草」「わけぎ」「未成熟ささげ」「葉にんにく」「らっきょう」「エンサイ」の使用液量を「100~300L/10a」とする。

(変更後) 全内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメリンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	チャノキイロアザミウマ ミカンハモグリガ アブラムシ類	1000～ 2000 倍	200～700 L/10a	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内		
	コアオハナムグリ ケシキスイ類、カメムシ類	2000 倍							
キウイフルーツ	キイロマイコガ	1000～ 2000 倍	60～150 L/10a	収穫 21 日前まで					
	キウイヒメコバイ	2000 倍							
麦類	アブラムシ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで				5 回以内	5 回以内
とうもろこし	アワノメイガ	1000～ 2000 倍							
	アワヨトウ	1000 倍							
	アブラムシ類	2000 倍							
だいず	マメシンクイガ、カメムシ類 フタスジヒメハムシ ジャガイモヒゲナガアブラムシ								
	えだまめ								
あずき					アブラムシ類、ノメイガ類				
いんげんまめ さやいんげん	アブラムシ類 インゲンテントウ								
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ				1000 倍				
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリハエ								
すいか	アブラムシ類	2000 倍							
	ミナミキイロアザミウマ	1000～ 2000 倍							
メロン	アブラムシ類	2000 倍							
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリハエ	1000 倍							
かぼちゃ	アブラムシ類、アザミウマ類 ハスモンヨトウ	2000 倍							
トマト	アブラムシ類 オンシツコナジラミ								
なす	ミナミキイロアザミウマ	1000 倍							
ピーマン、いちご	アブラムシ類	2000 倍							
ねぎ	シロイチモンジトウ	1000 倍	2000 倍						
	アブラムシ類、ネギコガ ネギハモグリハエ アザミウマ類								
たまねぎ	アザミウマ類 シロイチモンジトウ	48 倍	2.4L/10a	収穫 7 日前まで	無人ヘリコプター による散布				
にんじん	ヨトウムシ	2000 倍	100～300 L/10a	2 回以内	散布	2 回以内			
にら	ネギアザミウマ					3 回以内			

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シベルメリンを含む農薬の総使用回数			
にら(花茎)	ヨウムシ類 ネギコガ ハモグリハエ類	2000 倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3 回以内	散布	3 回以内			
ごぼう	アブラムシ類			収穫 14 日前まで	5 回以内		5 回以内			
ほうれんそう	ヨウムシ、アブラムシ類 ミナキイロアザミウマ	1000 倍	収穫 21 日前まで							
チンゲンサイ	アオムシ、アブラムシ類	2000 倍	25～180 L/10a	収穫前日まで	2 回以内		2 回以内			
こまつな さめきな	アブラムシ類			5 回以内	2 回以内		5 回以内			
レタス								収穫 7 日前まで	2 回以内	2 回以内
非結球レタス										
しそ	ヒシモンヨコバイ アブラムシ類	1500 倍	100～300 L/10a	発生初期～ 収穫 10 日前まで	2 回以内		1 回			
食用ぎく	アブラムシ類、アザミウマ類 オオタバコガ、ハスモンヨトウ ヨウムシ							収穫 3 日前まで		
たばこ	タバコアオムシ ヨウムシ	2000～ 3000 倍	100～300 L/10a	発生初期	6 回以内		2 回以内			
きく	アブラムシ類									
カーネーション	アブラムシ類、ヨウムシ類	2000 倍	200～700 L/10a	発生初期	6 回以内		6 回以内			
しきみ、さかき	アブラムシ類									
しそ科葉菜類 (しそ、バジル を除く)		収穫 7 日前まで	1 回	1 回						
バジル		収穫 3 日前まで	2 回以内	2 回以内						
食用プリムラ 食用金魚草		1500 倍			収穫 14 日前まで					
わけぎ	シロイモシヨトウ ネギハモグリハエ アブラムシ類 ネギコガ、アザミウマ類	1000 倍	100～300 L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	2 回以内				
未成熟ささげ	アブラムシ類	2000 倍					200～700 L/10a	発生初期	6 回以内	2 回以内
葉にんにく	ネギアザミウマ		収穫前日まで	3 回以内	3 回以内					
らっきょう			収穫 3 日前まで	5 回以内	5 回以内					
エンサイ			ハスモンヨトウ	2 回以内	2 回以内					
飼料用えんばく (は種用種子)	コクヌストモドキ	300 倍	種子 1kg 当り希釈液 20mL	貯蔵前	1 回	種子吹き付け 処理又は 塗沫処理	1 回			

注意事項の変更:

【追加事項】

- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。