

登 録 速 報

農 薬 名：マイウェイ1キロ粒剤（登録番号：第 22810 号）

適用拡大登録月日：平成25年4月24日

適用拡大登録内容：作物名「移植水稻」に、適用雑草名「オモダカ(九州)」を追加する。

（変更後）変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ(北海道を除く) ヘラオモダカ(北海道、東北) オモダカ クログワイ (北海道、九州を除く) ヒルムシロ セリ コウキヤガラ (関東・東山・東海、九州) アオミドロ・藻類による表層はく離(近畿・中国・四国、九州)	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで	砂壤土 ～ 埴土	1kg/10a	1回	湛水 散布	全域の 普通期及び 早期栽培地帯

オキサジクロメロンを含む 農薬の総使用回数	ピリミスルファンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更前】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ(北海道、東北は2葉期まで)、ミズガヤツリ(北陸、関東・東山・東海は2葉期まで)、ウリカワ(北海道、東北、北陸、関東・東山・東海は2葉期まで)、ヘラオモダカ(北海道は2葉期まで)は3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ(北海道、東北は2葉期まで)、ミズガヤツリ(北陸は2葉期まで)、ウリカワ(北海道、東北、北陸、関東・東山・東海は2葉期まで)、ヘラオモダカ(北海道は2葉期まで)は3葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。

以 上