登 録 速 報

農 薬 名:ホーネスト乳剤(登録番号:第 20355 号)日本曹達㈱登録

適用拡大登録月日:平成25年5月15日

適用拡大登録内容:

作物名「だいず」の使用時期について次のとおり変更する。

- ①「雑草生育期4科雑草3~5葉期 但し収穫60日前まで」を 「雑草生育期4科雑草3~5葉期 但し収穫14日前まで」とする。
- ②「雑草生育期4科雑草6~8葉期但し収穫60日前まで」を「雑草生育期4科雑草6~8葉期但し収穫14日前まで」とする。
- ③「雑草生育期44科雑草 9~10 葉期 但し収穫 60 日前まで」を 「雑草生育期44科雑草 9~10 葉期 但し収穫 14 日前まで」とする。

(変更後)変更作物のみ

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用	使用	*英田 地 世	テプラロキシジム
			薬量	希釈水量	回数	方法	適用地帯	を含む農薬の 総使用回数
だいず	一年生イネ科雑草	雑草生育期 イネ科雑草 3~5 葉期 但し収穫 14 日前まで	75 ~ 100ml/10a	100~150 L/10a		雑草 茎葉 散布	全域	1 🗇
	ー年生イネ科雑草 (スズメノカカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 6~8 葉期 但し収穫 14 日前まで		100L/10a	1 回			
		雑草生育期 イネ科雑草 9~10 葉期 但し収穫 14 日前まで					全域 (北海道を 除く)	

注意事項の変更:

【削除する事項】

●イネ科雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣ることがあるので時期を失しないよう均一に散布すること。

【変更する事項】

[変更前]

●遅効性であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10 日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意すること。

「変更後]

●遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7~10 日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意すること。