

登 録 速 報

農 薬 名：クミアイ スプラサイド水和剤（登録番号：第 23020 号）

適用拡大登録月日：平成25年6月12日

適用拡大登録内容：

- ①作物名「かんきつ(みかんを除く)」「みかん」に適用害虫名「カイガラムシ類(ヤノネカイガラムシを除く)」を追加する。
- ②作物名「なし(有袋栽培)」「なし(無袋栽培)」「ぶどう」「かき」「おうとう」「うめ」に適用害虫名「カイガラムシ類」を追加する。
- ③作物名「りんご」「もも」に適用害虫名「シンクイムシ類」、「カイガラムシ類」を追加する。
- ④作物名「ぶどう」における適用場所「温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所」に適用害虫名「カイガラムシ類」を追加する。

(変更後) 変更作物のみ

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	DMTPを含む農薬の総使用回数		
かんきつ (みかんを除く)	ヤノネカイガラムシ(幼虫 ～未成熟成虫)	1500 倍	200～700 L/10a	収穫 90 日 前まで	4 回以内	散布	4 回以内		
みかん	カメムシ類 カイガラムシ類(ヤノネカイ ガラムシを除く)			収穫 14 日 前まで			4 回以内(50～100 倍希釈 散布は 2 回以内)		
りんご	シンクイムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍		収穫 30 日 前まで	2 回以内		2 回以内		
	アブラムシ類 ハマキムシ類 (コカクモンハマキを除く) ギンモンハモグリガ カメムシ類 リンゴワタムシ	1500 倍							
なし(有袋栽培)	シンクイムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍		収穫 7 日 前まで	3 回以内			3 回以内	
	ナシホリガ カメムシ類 ナシチビガ	1500 倍							
なし(無袋栽培)	シンクイムシ類 アブラムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍		収穫 45 日 前まで	2 回以内				2 回以内
	ナシホリガ カメムシ類 ナシチビガ	1500 倍							
もも	モモハモグリガ シンクイムシ類 カイガラムシ類	1500～ 2000 倍	収穫 21 日 前まで	2 回以内	4 回以内 (200 倍希釈散布 は 2 回以内、1500 ～2000 倍希釈散 布は 2 回以内)				

作物名	適用害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	DMTPを含む 農薬の総使用回数
ぶどう	カイガラムシ類	1500倍	200～700 L/10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内 (休眠期は1回以内)
	ブドウネアブラムシ	500倍	10 L/m ²	収穫90日 前まで		土壌 灌注	
かき	カイガラムシ類 カキタマアザミウマ カキヒメヨコバイ カメシ類	1500倍	200～700 L/10a	収穫30日 前まで	3回以内	散布	3回以内
	チャノキイロアザミウマ	1000倍		収穫7日 前まで			
おうとう	カイガラムシ類 カメシ類 ショウジョウバエ類	1500倍					
うめ	カイガラムシ類						

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	DMTPを 含む農薬の 総使用回数
ぶどう	温室、 ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる場所	カイガラムシ類	200g/10a	9L/10a	収穫14日前 まで	2回以内	常温煙霧	2回以内 (休眠期は 1回以内)

注意事項の変更：なし

以上