

登 録 速 報

農 薬 名：ポデーガードジャンボ（登録番号：第 22617 号）

適用拡大登録月日：平成25年6月26日

適用拡大登録内容：

適用雑草名「コウキヤガラ(九州)」及び「シズイ(東北)」を追加する。

(変更後) 全内容

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツハイ、ホタルイ ヘラオモダカ(北海道、東北) ミスガヤツリ(北海道を除く) ウリカワ クログワイ(北海道を除く) オモダカ、ヒルムシロ、セリ エゾノサヤヌカグサ(北海道) コウキヤガラ(九州) シズイ(東北)	移植後 5 日～ ビエ 2.5 葉期 ただし、 移植後 30 日 まで	砂壤土 ～ 埴土	小包装(パック) 10 個 (400g)/10a	1 回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	全域の 普通期及び 早期栽培地帯

テフルトリオンを含む 農薬の総使用回数	フェントラザミドを含む 農薬の総使用回数
2 回以内	1 回

注 意 事 項 の 変 更：以下の項目に「コウキヤガラ」「シズイ」を追加。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、田植え 5 日後からノビエの 2.5 葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、エゾノサヤヌカグサは 2 葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生前から再生始期まで、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生始期までが本剤の散布適期である。クログワイ、オモダカ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないのので、有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

以 上