

登 録 速 報

農 薬 名：ナギナタジャンボ（登録番号：第 23331 号）

適用拡大登録月日：平成26年7月23日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」に、適用雑草名「クログワイ（近畿・中国・四国）」を追加する。
- 作物名「移植水稻」の適用地帯「北陸、関東・東山・東海、近畿・中国・四国、九州の普通期及び早期栽培地帯」に、適用土壌「砂壤土」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) ヒルムシロ セリ クログワイ (近畿・中国・四国)	移植後3日～ ノビエ2.5葉期但し、移植後30日まで	砂壤土～埴土	小包装 (パック) 10個 (250g) /10a	1回	水田に小包装 (パック) のまま投げ入れる。	全域 (北海道を除く) の普通期及び 早期栽培地帯
			壤土～埴土				北海道

オキサジクロメホンを含む 農薬の総使用回数	ピリミスルファンを含む 農薬の総使用回数	ベンゾビシクロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更前】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ミズガヤツリ（北陸は発生始期まで）、ウリカワ（北海道、北陸は発生始期まで）、ヘラオモダカは2葉期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2.5葉期までに、時期を失しな

いように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ミズガヤツリ（北陸は発生始期まで）、ウリカワ（北海道、北陸は発生始期まで）、ヘラオモダカは2葉期まで、クログワイは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。

【追加】

- クログワイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

以 上